

悉尼性保健中心提供免费,保密和全面性的服务,以便帮助你掌管你的性方面的健康.本服务帮助你维持性方面的健康的方法是提供性感染的检验,疫苗接种和处理,包括人体免疫力缺乏病毒(简称 HIV),乙型肝炎(HEPATITIS B),女士和男士性健康方面的医疗服务,教育,给予个别人士和夫妻的辅导,及注射和针筒的交换.本服务让你选择见男或女的医生,护士和辅导员,他们都会尊重你的生活方式和性行为.

无需出示医疗卡

Opening hours

Please visit our website


Web Address:

http://www.sshc.org.au/

Telephone Number: 02 9382 7440 Sexual Health Info line: 1800 451 624

新南威尔士洲性保健 免费和保密的性保健方面的医疗服务

	шилес/1 //к//
Albury	Ph: (02) 6058 1840
Armidale	Ph: (02) 6776 4738
Bourke	Ph: (02) 6872 2145
Broken Hill	Ph: (08) 8080 1556
Canberra	Ph: (02) 6244 2184
Coffs Harbour	Ph: (02) 6656 7865
Dareton	Ph: (03) 5021 7200
Dubbo	Ph: (02) 6885 1700
Forster	Ph: (02) 6555 6822
Gosford	Ph: (02) 4320 2114
Goulburn	Ph: (02) 4827 3913
Griffith	Ph: (02) 6966 9900
Katoomba	Ph: (02) 4784 6560
Kings Cross	Ph: (02) 9360 2766
Kogarah	Ph: (02) 9350 2742
Lightning Ridge	Ph: (02) 6829 1022
Lismore	Ph: (02) 6620 2980
Liverpool	Ph: (02) 9827 8022
Manly	Ph: (02) 9977 3288
Marrickville	Ph: (02) 9560 3057
Mt Druitt	Ph: (02) 9881 1733
Newcastle	Ph: (02) 4923 6909
Nowra	Ph: (02) 4423 9353
Orange	Ph: (02) 6392 8600
Parramatta	Ph: (02) 9843 3124
Penrith	Ph: (02) 4734 2507
Port Kembla	Ph: (02) 4276 2399
Queanbeyan	Ph: (02) 6298 9233
Richmond	Ph: (02) 4578 1622
St Leonards	Ph: (02) 9926 7414
Sydney City	Ph: (02) 9382 7440
Tamworth	Ph: (02) 6766 3095
Taree	Ph: (02) 6592 9421
Wagga Wagga	Ph: (02) 6938 6492



什么是传染性软疣?

传染性软疣是一种皮肤的病毒性感染,它呈 现出中间凹陷的,小的坚实团块,呈白色或具 有蜡样光泽.在儿童,传染性软疣通常感染面 部及手臂.

在成人, 传染性软疣主要出现在生殖器周围, 但也可能感染身体其他部位. 因为外观相 似. 传染性软疣有时被误诊为疣或者丘疹.

人如何受到感染?

传染性软疣通过亲密的身体接触(皮肤到皮 肤)传播.你不需要通过性行为就可以受到感 染.

如何检测传染性软疣?

由于传染性软疣外观特征非常明显,医生或 性健康门诊通过检查即可诊断.

传染性软疣有并发症吗?

传染性软疣的并发症非常少见.免疫系统受 到抑制的人(如 HIV)可能会出现广泛的且难 以治疗的传染性软疣。

治疗方法是什么?

传染性软疣可通过'冷冻法'夫除.

治疗可能有轻度的不适.即使不经治疗, 传 染性软疣最终也会自动消除.但这可能需要 两周到两年时间,而且若不治疗,可能会传染 给其他人.

性伴侣需要治疗吗?

若性伴侣出现任何难以解释的团块,建议最 好去看医生或护士,进行检查.

如何正确使用避孕套



Open Carefully...

- 选择一个适合你的品牌的避
- 不要用牙咬开包装.不要用指 甲撕破避孕套.
- 查看使用日期.



- 挤压住避孕套的末端并套在 勃起的阴茎上
- 如果没有进行过包皮切割手 术.在戴避孕套之前拉开包皮.
- 将避孕套完全戴到阴茎的根



- 经常使用水性润滑剂.
- 不要使用按摩油或凡士林.
- 在性交过程中,经常检查避孕 套是否保持在原位.



- 性交结束后,在阴茎仍勃起的 情况下取下避孕套.
- 紧握避孕套的根部以避免精 液流出.
- ●一个避孕套只能使用一次.