


시드니 성건강 센터



시드니 성건강 센터는 비공개적이고 무료이며 여러분의 성건강 관리에 도움이 되는 포괄적 서비스를 제공합니다. 본 서비스는 예비검사, 예방접종, HIV 와 B 형 간염을 비롯한 성병 관리, 남녀 성건강 관리, 교육, 개인 및 커플 상담, 주사기 및 주사바늘 교환 등을 통해 여러분의 성건강에 도움을 드립니다. 본 서비스는 여러분의 라이프스타일과 성적 특질을 존중하는 남녀 의사/간호사/카운셀러로 구성되어 있습니다.

메디케어 카드가 필요없음

Opening hours

Please visit our website

Web Address:

<http://www.sshc.org.au/>

Telephone Number: 02 9382 7440

Sexual Health Info line: 1800 451 624

NSW 성건강 서비스

무료 & 비공개 성건강 관리

Albury	Ph: (02) 6058 1840
Armidale	Ph: (02) 6776 4738
Bourke	Ph: (02) 6872 2145
Broken Hill	Ph: (08) 8080 1556
Canberra	Ph: (02) 6244 2184
Coffs Harbour	Ph: (02) 6656 7865
Dareton	Ph: (03) 5021 7200
Dubbo	Ph: (02) 6885 1700
Forster	Ph: (02) 6555 6822
Gosford	Ph: (02) 4320 2114
Goulburn	Ph: (02) 4827 3913
Griffith	Ph: (02) 6966 9900
Katoomba	Ph: (02) 4784 6560
Kings Cross	Ph: (02) 9360 2766
Kogarah	Ph: (02) 9350 2742
Lightning Ridge	Ph: (02) 6829 1022
Lismore	Ph: (02) 6620 2980
Liverpool	Ph: (02) 9827 8022
Manly	Ph: (02) 9977 3288
Marrickville	Ph: (02) 9560 3057
Mt Druitt	Ph: (02) 9881 1733
Newcastle	Ph: (02) 4923 6909
Nowra	Ph: (02) 4423 9353
Orange	Ph: (02) 6392 8600
Parramatta	Ph: (02) 9843 3124
Penrith	Ph: (02) 4734 2507
Port Kembla	Ph: (02) 4276 2399
Queanbeyan	Ph: (02) 6298 9233
Richmond	Ph: (02) 4578 1622
St Leonards	Ph: (02) 9926 7414
Sydney City	Ph: (02) 9382 7440
Tamworth	Ph: (02) 6766 3095
Taree	Ph: (02) 6592 9421
Wagga Wagga	Ph: (02) 6938 6492

want to know
more about

Korean
[SSH-7885]

전염성 연속종

**MOLLUSCUM
CONTAGIOSUM**

SYDNEY
SSHHC
SEXUAL
HEALTH
CENTRE

전염성 연속종이란 무엇인가?

전염성 연속종은 피부의 바이러스 감염증입니다. 전염성 연속종은 모양이 작고 단단한 백색 구진으로 가운데가 움푹하게 들어갔거나 광택이 납니다. 전염성 연속종은 아동의 경우 얼굴과 팔에 생깁니다.

성인의 경우에는 전염성 연속종이 주로 음부에 생기지만 다른 부위에 생길 수도 있습니다. 전염성 연속종은 그 모양으로 인해 사마귀로, 그리고 심지어는 뽕루지로, 오인되기도 합니다.

전염 경로는 어떻게 되나?

전염성 연속종은 밀접한 신체 접촉(피부가 서로 닿음)에 의해 전염됩니다. 전염성 연속종은 성교를 하지 않고도 전염될 수 있습니다.

전염성 연속종의 검사 방법은?

전염성 연속종은 모양이 특이하므로 의원이나 성건강 진료소에서 진찰 시에 진단할 수 있습니다.

전염성 연속종은 합병증이 있는가?

전염성 연속종은 합병증이 거의 없습니다. 면역력이 약화된 사람(예, HIV 보균자)의 경우는 전염성 연속종이 크게 퍼져서 치료하기가 더 어려울 수도 있습니다.

치료 방법은?

치료는 약간의 통증을 수반할 수 있습니다. 전염성 연속종은 치료하지 않아도 언젠가는 저절로 사라집니다. 그러나 그렇게 될 때까지는 2주 내지 2년이 걸리며, 치료하지 않으면 다른 사람들에게 전염될 수 있습니다.

섹스파트너도 치료를 받아야 하나?

섹스파트너에게도 원인을 알 수 없는 구진이 생겼을 경우 의사나 간호사에게 검진을 받아보는 것이 좋습니다.

콘돔을 바르게 사용하는 방법

편안하게 맞는 브랜드를 선택합니다.

포장을 뜯을 때 치아를 사용하지 않도록 합니다.

콘돔을 손톱으로 찢는 일이 없도록 주의합니다.

“사용유효”날짜를 확인합니다.

콘돔의 끝부분을 잡고 누른 후 발기된 음경 위에 펼칩니다.

포경수술을 하지 않은 경우에는 포피를 뒤로 잡아당기고 펼칩니다. 콘돔을 음경의 밑부분까지 완전히 펼칩니다.

반드시 수성 윤활제를 사용합니다. 기름이나 바셀린을 사용하면 안됩니다.

섹스도중 콘돔이 빠지지 않았는지 확인합니다.

끝난 후에는 음경이 여전히 발기된 상태에서 뺏니다.

뺏 때는 콘돔이 같이 나오도록 콘돔의 밑부분을 잡고 뺏니다.

콘돔은 일회용입니다.

