

ਛੂਤ ਵਾਲੇ ਰੋਗ ਦੀ ਤੱਥ-ਸੀਟ

## ਹੈਮੋਫਿਲਸ ਇਨਫਲੂਐਂਜ਼ਾ – ਕਿਸਮ ਬੀ (Hib) ਹਿੱਬ ਰੋਗ

**Hib ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਰਾਹੀਂ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ ਛੂਤ ਨਾਲ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਝਿੱਲੀ ਦੀ ਸੋਜ (meningitis) ਅਤੇ ਘੰਡੀ-ਢੱਕਣ ਦੀ ਸੋਜ (epiglottitis) ਸਮੇਤ ਗੰਭੀਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਰੋਗ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹਨ। Hib ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਇਲਾਜ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ Hib ਰੋਗ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।**

### Hib ਰੋਗ ਕੀ ਹੈ?

Hib ਰੋਗ ਹੈਮੋਫਿਲਸ ਇਨਫਲੂਐਂਜ਼ੇ (*Haemophilus influenzae*) ਕਿਸਮ ਦੇ ਬੀ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਛੂਤ ਨਾਲ ਇਹ ਰੋਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ

- ਮੈਨਿਨਜਾਇਟਿਸ (Meningitis ਭਾਵ ਦਿਮਾਗ ਅਤੇ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਦੁਆਲੇ ਦੀਆਂ ਝਿੱਲੀਆਂ ਦੀ ਛੂਤ)
- ਐਪੀਗਲੋਟਾਈਟਿਸ (Epiglottitis ਭਾਵ ਗਲ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਘੰਡੀ ਦੀ ਤੀਬਰ ਸੋਜ)
- ਨਿਮੋਨੀਆ (Pneumonia ਭਾਵ ਫੇਫੜਿਆਂ ਦੀ ਛੂਤ)
- ਔਸਟੀਓਮਾਈਲਾਈਟਿਸ (Osteomyelitis ਭਾਵ ਹੱਡੀਆਂ ਅਤੇ ਜੋੜਾਂ ਦੀ ਛੂਤ)
- ਸੈਲਿਯੂਲਾਈਟਿਸ (Cellulitis ਭਾਵ ਚਮੜੀ ਦੇ ਹੇਠਾਂ, ਆਮ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਚਿਹਰੇ ਉੱਤੇ ਉਤਕਾਂ ਦੀ ਛੂਤ)

ਇਹ ਸਥਿਤੀਆਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਕਸਤ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ meningitis ਤੇ epiglottitis ਕਈ ਵਾਰ ਘਾਤਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ (ਹੋਰ ਕੀਟਾਣੂ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਣ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ)। ਇੱਥੇ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਐਚ. ਇਨਫਲੂਐਂਜ਼ੇ ਬੈਕਟੀਰੀਆ (ਕਿਸਮ ਬੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪਰ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹਮਲੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ) ਹਨ। Hib ਛੂਤਾਂ ਹੁਣ ਬਿਲਕੁਲ ਘੱਟ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। Hib ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ meningitis ਰੋਗ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਣ ਹੁੰਦਾ ਸੀ।

### ਇਸ ਦੇ ਲੱਛਣ ਕੀ ਹਨ?

ਲੱਛਣ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰੀਰ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਹਿੱਸਾ ਛੂਤ ਤੋਂ ਗ੍ਰਸਤ ਹੈ।

- **Meningitis** - ਬੁਖਾਰ, ਸਿਰ ਦਰਦ, ਗਰਦਨ ਵਿਚ ਅਕੜਾਅ, ਜੀਅ ਮਿਤਲਾਉਣਾ, ਉਲਟੀਆਂ ਅਤੇ ਸੁਸਤੀ
- **Pneumonia** - ਸਾਹ ਘੁੱਟਣਾ, ਬੁਖਾਰ, ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ, ਭੁੱਖ ਨਾ ਲੱਗਣੀ, ਸਿਰ ਦਰਦ, ਛਾਤੀ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਤੇ ਖੰਘ
- **Epiglottitis** - ਸਾਹ ਅਤੇ ਖਾਣਾ ਨਿਗਲਣ ਵਿੱਚ ਔਖ, ਪਿਲੱਤਣ ਅਤੇ ਬੁਖਾਰ
- **Osteomyelitis** - ਪੀੜਤ ਹੱਡੀ ਉੱਤੇ ਸੋਜ, ਜਲਣ ਅਤੇ ਦਰਦ

## ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਫੈਲਦਾ ਹੈ?

Hib ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਸਿਹਤਮੰਦ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਗਲੇ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਆਮ ਘਰਾਂ ਵਰਗੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਛੂਤਗ੍ਰਸਤ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਨੱਕ ਜਾਂ ਗਲੇ 'ਚੋਂ ਨਿੱਕਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਖੂਨਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਰਾਹੀਂ ਫੈਲਦਾ ਹੈ। ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਲੱਛਣ ਵਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹੋਣ।

## ਜੋਖਮ ਜਾਂ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਹੈ?

ਜਿਹੜੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਛੂਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਤਰਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:

- ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚੇ
- ਮੂਲ ਵਾਸੀ (Aboriginal) ਅਤੇ ਟੋਰੈਸ ਸਟਰੈਟ ਆਈਲੈਂਡਰ (Torres Strait Islander) ਬੱਚੇ
- ਹੋਰ ਬਿਮਾਰੀ ਵਾਲੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਿਕਲ ਸੈਲ ਰੋਗ, ਐਚ ਆਈ ਵੀ/ਏਡਜ਼, ਗ਼ੈਰ-ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਤਿੱਲੀ, ਇੱਕ ਬੇਨ ਮੈਰੋ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਜਾਂ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਇਲਾਜ ਨਾਲ ਜਿਉਂ ਰਹੇ ਲੋਕ

## ਇਸ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ?

NSW ਵਿੱਚ Hib ਵੈਕਸੀਨ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਖੁਰਾਕਾਂ ਦੇ, ਚਾਰ, ਛੇ ਅਤੇ ਬਾਰਾਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।

## ਇਸ ਰੋਗ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ?

ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ Hib ਰੋਗ ਦੀ ਤਸਖੀਸ (ਜਾਂ ਪਛਾਣ) ਤੁਹਾਡੇ ਲੱਛਣਾਂ, ਇੱਕ ਨਿਰੀਖਣ ਅਤੇ ਕੁੱਝ ਟੈਸਟ ਕਰਕੇ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਟੈਸਟਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਛੂਤਗ੍ਰਸਤ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਲਈ ਟੈਸਟ ਵਾਸਤੇ ਨਮੂਨੇ (ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ ਖੂਨ ਜਾਂ ਸੈਰੀਬਰੋਸਪਾਈਨਲ ਤਰਲ ਪਦਾਰਥ) ਲੈਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।


## ਇਸ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ?

ਇਲਾਜ ਵਿੱਚ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕਸ, ਬੁਖਾਰ ਅਤੇ ਦਰਦ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਦਵਾਈ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੈਰਾਸੀਟਾਮੋਲ), ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਤਰਲ ਪਦਾਰਥ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

## ਜਨ ਸਿਹਤ ਦਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਕੀ ਹੈ?

Hib ਰੋਗ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਬਾਰੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਲੈਬਰਟਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੀ ਗੁਪਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਜਨ ਸਿਹਤ ਇਕਾਈ (Public Health Unit) ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਨ ਸਿਹਤ ਇਕਾਈ ਦਾ ਸਟਾਫ਼, ਡਾਕਟਰ, ਰੋਗੀ ਜਾਂ ਰੋਗੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਛੂਤ ਦੇ ਖਤਰੇ 'ਚ ਆ ਸਕਣ ਵਾਲੇ ਨੇੜਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਸਨਾਖਤ ਹੋ ਸਕੇ ਅਤੇ ਖਤਰੇ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਗ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਸਕੇ, ਅਤੇ ਜੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕਸ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਣ।

ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ - NSW ਵਿੱਚ ਜਨ ਸਿਹਤ ਇਕਾਈਆਂ



1300 066 055

[www.health.nsw.gov.au](http://www.health.nsw.gov.au)