

បណ្តាញមានអំពីជំងឺឆ្លង

ជំងឺរលាកថ្លើមប្រភេទ B

ជំងឺរលាកថ្លើមប្រភេទ B គឺជាជំងឺឆ្លងដ៏ធ្ងន់ធ្ងរដែលឆ្លងរាលដាលតាមរយៈឈាមឬជាតិទឹកនៃរាងកាយ។ កុមារទាំងអស់ និងមនុស្សពេញវ័យដែលមានគ្រោះថ្នាក់កើតជំងឺនេះ គួរចាក់ថ្នាំបង្ការជំងឺនេះ។ ការរួមភេទដោយប្រើវិធីការពារនិងការប្រើគ្រឿងសម្ភារៈនិងគ្រឿងបរិក្ខារដែលមានការរួមប្រាប់មេរោគ មានសារសំខាន់ ក្នុងការបង្ការកុំឲ្យកើតជំងឺនេះ។

តើជំងឺថ្លើមប្រភេទ B គឺជាអ្វីទៅ?

- ជំងឺរលាកថ្លើមប្រភេទ B គឺជាជំងឺថ្លើមដែលបណ្តាលដោយវីរុសមួយហៅថាមេរោគរលាកថ្លើមប្រភេទ B ។ ‘ជំងឺរលាកថ្លើម’ មានន័យថា ‘ការរលាកឬហើមនៃថ្លើម’។
- នៅពេលកើតមានហើម អ្នកកើតជំងឺនេះនឹងជាវិបត្តិសះស្បើយ និងគ្មានបញ្ហាអ្វីទៅទៀតទេ; ឬ
- កើតមានជំងឺនេះយ៉ាងរ៉ាំរ៉ៃ។ ជួនកាលអ្នកកើតជំងឺនេះរ៉ាំរ៉ៃត្រូវបានស្គាល់ថាជា ‘អ្នកផ្ទុកមេរោគក្នុងខ្លួន’។
- អ្នកខ្លះដែលមានជំងឺនេះរ៉ាំរ៉ៃ អាចមានបញ្ហាសុខភាពពាក់ព័ន្ធនឹងការកើតជំងឺនេះ ហើយអ្នកខ្លះទៀតនឹងគ្មានបញ្ហានេះទេ។ ថាតើអ្នកណាដែលជាសះស្បើយពីជំងឺនេះឬមានជំងឺនេះរ៉ាំរ៉ៃ គឺផ្អែកជាសំខាន់លើអាយុរបស់អ្នកនោះ៖ ទារកទើបកើតថ្មីចំនួន 90% កុមារអាយុពី 1-5 ឆ្នាំ ចំនួន 20-50% និងកុមារអាយុច្រើនជាងនោះព្រមទាំងជនពេញវ័យចំនួន 1-10% កើតជំងឺនេះរ៉ាំរ៉ៃ។ ជាធម្មតា អ្នកកើតជំងឺរ៉ាំរ៉ៃនេះអាចចម្លងមេរោគមួយជីវិតបាន ហើយអាចមានជំងឺរលាកថ្លើមតទៅទៀត។ ក្រោយពីពេលជាច្រើនឆ្នាំមក ជំងឺនេះអាចបណ្តាលឲ្យមានផលវិបាកធានា ដូចជាជំងឺថ្លើមក្រិន ឬមហារីកថ្លើមជាដើម។

តើជំងឺនេះមានរោគសញ្ញាអ្វីខ្លះ?

- មនុស្សជាច្រើនគ្មានរោគសញ្ញាទាំងឡាយនៅពេលដែលទើបនឹងឆ្លងរោគនេះ។
- នៅពេលមានរោគសញ្ញា ជាធម្មតាវាមានរួមទាំងជំងឺខាងលើ (ស្បែកនិងភ្នែកឡើងពណ៌លឿង) ទឹមនោមមានពណ៌ក្រហម លាមកមានពណ៌ស្លេកខ្លាំង អស់កម្លាំង ឈឺពោះ មិនឃ្លានចំណីអាហារ ចង្អោរ ក្អក និងឈឺសន្លាក់ឆ្អឹង។

តើជំងឺនេះឆ្លងតាមរបៀបណា?

ជំងឺរលាកថ្លើមប្រភេទ B ឆ្លងទៅកាន់អ្នកដទៃនៅពេលដែលឈាមឬវត្ថុរាវនៃរាងកាយ (ឧទាហរណ៍៖ ទឹកមាត់ ទឹកកាម និងជាតិទឹកចេញពីយោនី) ដែលមានវីរុសជំងឺរលាកថ្លើមប្រភេទ B ចូលទៅក្នុងរាងកាយនៃមនុស្សម្នាក់ទៀតតាមរយៈ៖

- ស្បែកមុតជាប់រលាត់
- ភ្លាសកោសិកា
- ផ្លូវឈាមរត់ តាមរយៈការប្រើធាតុគ្រឿងបរិក្ខារពាក់ដែលមានមេរោគ ឬការប្រើមូលក្រោយពីបានប្រើដោយអ្នកកើតជំងឺមុនរបស់មុតដោយមូលពាក់ដែលមិនរួមប្រាប់មេរោគ ឬគ្រឿងប្រដាប់មានមេរោគ។

- ការរួមភេទជាមួយអ្នកកើតជំងឺដោយមិនប្រើស្រោមអនាម័យ។
- ជំងឺរលាកថ្លើមប្រភេទ B ក៏អាចឆ្លងពីមាតាដែលកើតជំងឺទៅកាន់ទារកនៅពេលប្រសូតផងដែរ។

តើអ្នកណាដែលអាចមានគ្រោះថ្នាក់កើតជំងឺនេះ?

អ្នកមានគ្រោះថ្នាក់ឆ្លងរោគមានរួមទាំង៖

- ដៃគូរួមភេទនៃអ្នកកើតជំងឺ
- អ្នកចាក់គ្រឿងញៀន
- ទារករបស់មាតាដែលកើតជំងឺ
- អ្នកមានដៃគូរួមភេទច្រើននាក់
- បុរសដែលរួមភេទជាមួយបុរសដូចគ្នា
- អ្នកជំងឺតំរង់ទឹកដោមដែលត្រូវការជំនួយពីម៉ាស៊ីនសំអាតឈាម
- បុគ្គលិកថែទាំសុខភាព
- កូនរបស់អ្នកដែលមានកំណើតនៅក្នុងប្រទេសទាំងឡាយដែលមានអត្រាកើតជំងឺរលាកថ្លើមប្រភេទ B ខ្ពស់
- ការប៉ះពាល់នៃសមាជិកក្នុងផ្ទះជាមួយនឹងអ្នកកើតជំងឺរលាកថ្លើមប្រភេទ B
- អ្នកជាប់ពន្ធនាគារ។

តើវិធីបង្ការជំងឺនេះធ្វើឡើងដោយរបៀបណា?

ការចាក់ថ្នាំបង្ការរោគ

ថ្នាំបង្ការជំងឺរលាកថ្លើមប្រភេទ B មានប្រសិទ្ធភាពណាស់ក្នុងការបង្ការមិនឲ្យឆ្លងជំងឺនេះ។ ការចាក់ថ្នាំបង្ការរោគនេះគួរផ្តល់ឲ្យ៖

- កុមារទាំងអស់នៅពេលប្រសូត អាយុពីរខែ បួនខែ និងប្រាំមួយខែ។ ថ្នាំបង្ការរោគត្រូវបានចាក់ឲ្យទារកនៅឯមន្ទីរពេទ្យដែលទារកនោះប្រសូតមក និងដោយវេជ្ជបណ្ឌិតឬមន្ទីរព្យាបាលក្នុងតំបន់លោកអ្នក ជាផ្នែកនៃការចាក់ថ្នាំបង្ការរោគសំរាប់កុមារភាពជាប្រក្រតី។
- កុមារអាយុ 12 ឆ្នាំទាំងអស់ដែលមិនបានចាក់ថ្នាំបង្ការរោគកាលនៅជាទារក។ ថ្នាំបង្ការរោគត្រូវបានផ្តល់ឲ្យនៅសាលាមធ្យមសិក្សា។
- អ្នកដែលប្រើរបស់នៅក្នុងផ្ទះរួមគ្នាជាមួយអ្នកមានជំងឺរ៉ាំរ៉ៃ ឬតាមរយៈការរួមភេទជាមួយនឹងអ្នកមានជំងឺរ៉ាំរ៉ៃ
- បុរសដែលរួមភេទជាមួយបុរសដូចគ្នា
- អ្នកមានជំងឺកាមរោគដែលអាចចម្លងទៅអ្នកដទៃ
- អ្នកចាក់គ្រឿងញៀន
- អ្នកជំងឺតំរង់ទឹកដោមដែលត្រូវការជំនួយពីម៉ាស៊ីនសំអាតឈាម
- អ្នកដែលទទួលសារធាតុរបស់ឈាមដោយសារតែមានបញ្ហាឈាមមិនកក
- អ្នកមានជំងឺថ្លើមរ៉ាំរ៉ៃ ឬកើតជំងឺរលាកថ្លើមប្រភេទ C
- គេបាជននិងបុគ្គលិកនៃកន្លែងសំរាប់អ្នកមានពិការភាពបញ្ញា
- អ្នកជាប់ពន្ធនាគារនិងបុគ្គលិកនៃមន្ទីរពន្ធនាគារ
- បុគ្គលិកថែទាំសុខភាព
- អ្នកអប់សព
- បុគ្គលិកគ្រាអាសន្ន។

ការបង្ការការឆ្លងរាលដាល

ដើម្បីបង្ការការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺរលាកថ្លើមប្រភេទ B ៖

- ត្រូវចាក់ថ្នាំបង្ការរោគ

- ត្រូវប្រើស្រោមអនាម័យបើលោកអ្នករួមភេទជាមួយដៃគូរួមភេទថ្មី ឬជាមួយអ្នកកើតជំងឺរលាកថ្លើមប្រភេទ B បើលោកអ្នកមិនបានចាក់ថ្នាំបង្ការរោគទេនោះ
- បើអ្នកមានផ្ទៃពោះ អ្នកគួរធ្វើតេស្តឈាមរកមើលរោគរលាកថ្លើមប្រភេទ B ក្នុងក្មេងដែលម្តាយមានជំងឺរលាកថ្លើមប្រភេទ B គួរចាក់ថ្នាំបង្ការរោគរលាកថ្លើមប្រភេទ B (HBIG) និងថ្នាំបង្ការរោគក្នុងរង្វង់ពេល 12 ម៉ោង ក្រោយពីប្រសូតមក
- កុំប្រើគ្រឿងបរិក្ខារចាក់ច្របូកច្របល់ជាមួយអ្នកដទៃ
- កុំប្រើច្របូកច្របល់ជាមួយអ្នកដទៃនូវវត្ថុផ្ទាល់ខ្លួនទាំងឡាយដែលមានឈាមប្រឡាក់ (ឧទាហរណ៍៖ កាំបិតកោរពុកមាត់ ឬ ច្រាសដុសធ្មេញ)
- បើត្រូវការសាក់ឬចោះផ្នែកណាមួយនៃរាងកាយរបស់លោកអ្នក ត្រូវធ្វើឲ្យប្រាកដថា អ្នកដែលធ្វើឲ្យលោកអ្នកប្រើគ្រឿងបរិក្ខារ បោះចោលក្រោយប្រើហើយ និងជាគ្រឿងដែលបានម្ចាស់មេរោគហើយ
- អ្នកគួរចាក់ថ្នាំបង្ការរោគដែលប៉ះពាល់អ្នកកើតជំងឺរលាកថ្លើមប្រភេទ B គួរចាក់ថ្នាំ HBIG និងថ្នាំបង្ការរោគប្រឡាក់សាមលទ្ធភាព ដោយត្រូវធ្វើទៅនៅក្នុងរង្វង់ពេល 72 ម៉ោងសំរាប់ការប៉ះពាល់តាមរយៈឈាម និងនៅក្នុងរង្វង់ពេល 14 ថ្ងៃសំរាប់ការប៉ះពាល់តាមរយៈការរួមភេទ។

បើលោកអ្នកកើតជំងឺនេះ សូម៖

- កុំធ្វើអំណោយឈាម សរីរាង្គ ឬជាលិកា បើលោកអ្នកមានជំងឺរលាកថ្លើមប្រភេទ B
- ប្រាប់វេជ្ជបណ្ឌិតនិងពេទ្យធ្មេញរបស់លោកអ្នកថា លោកអ្នកមានជំងឺនេះ
- ប្រុងប្រយ័ត្នខ្លាំងដើម្បីធានាថា អ្នកដទៃមិនប៉ះឈាមឬវត្ថុរាវនៃរាងកាយរបស់លោកអ្នក។ សូមជួតសំអាតការកំពប់ជាមួយនិងក្រដាសកន្សែងពោះគោ និងលាងសម្អាតឲ្យបានម៉ត់ចត់ជាមួយសាប៊ូនិងទឹក រហូតទាល់តែគ្មានឃើញស្នាមប្រឡាក់សោះឡើយ។ បើមានឈាមច្រើនប្រឡាក់កំពប់ព្រំ លោកអ្នកប្រហែលជាត្រូវសម្អាតដោយប្រើសាប៊ូពិសេសសំរាប់ កំពប់ព្រំ (shampoo) ឬវិធីសម្អាតដោយចំហាយ (steam clean)។
- គ្របមុខរបួសជាមួយនិងក្រណាត់រុំរបួសដែលមិនជ្រាបទឹក។
- ប្រើស្រោមអនាម័យក្នុងការរួមភេទជាមួយនិងដៃគូរួមភេទថ្មី និងជាមួយនិងដៃគូដែលគ្មានប្រព័ន្ធការពារទប់ទល់រោគនេះ។

តើការវិនិច្ឆ័យរោគធ្វើទៅតាមរបៀបណា?


ការធ្វើតេស្តឈាមអាចបង្ហាញថាតើអ្នកណាមួយបានកើតជំងឺរលាកថ្លើមប្រភេទ B នៅពេលកន្លងមក និងថាតើអ្នកណាមួយកើតជំងឺនេះដំរីវិញ។ តេស្តផ្សេងទៀតដូចជាតេស្តអំពីការបំពេញមុខងាររបស់ថ្លើម អាចបង្ហាញថាតើថ្លើមមានការខូចខាតណាដែរឬទេ។

តើវិធីព្យាបាលជំងឺនេះធ្វើឡើងដោយរបៀបណា?

អ្នកខ្លះអាចទទួលបានប្រយោជន៍ពីការព្យាបាលពិសេសប្រឆាំងវិរុស។ សូមពិភាក្សាជាមួយវេជ្ជបណ្ឌិតលោកអ្នកអំពីលទ្ធភាពនៃការព្យាបាល។ អ្នកកើតជំងឺរលាកថ្លើមប្រភេទ B គួរថែទាំថ្លើមរបស់ខ្លួន និងចាក់ថ្នាំបង្ការជំងឺរលាកថ្លើមប្រភេទ A បើគ្មានប្រព័ន្ធការពាររោគទល់នឹងជំងឺនេះរួចហើយទេនោះ។ ការទទួលបានសុខភាពអាចធ្វើឲ្យជំងឺថ្លើមរបស់លោកអ្នករឹតតែមានភាពធ្ងន់ធ្ងរឡើង។

តើផ្នែកសុខភាពសាធារណៈមានវិធានការឆ្លើយតបអ្វីខ្លះ?

ជំងឺរលាកថ្លើមប្រភេទ B ត្រូវបានរាយការណ៍ឲ្យដឹងដោយទាំងវេជ្ជបណ្ឌិតនិងទាំងមន្ទីរពិសោធន៍។ បុគ្គលិកផ្នែកសុខភាពសាធារណៈ (Public Health Unit) អង្កេតករណីថ្មីៗនៃការកើតមានជំងឺនេះ ដើម្បីរកមើលដឹងកត្តាគ្រោះថ្នាក់ និងជួយគ្រប់គ្រងការឆ្លងរាលដាលតទៅទៀត។



1300 066 055

www.health.nsw.gov.au