

ເຈ້ຍຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບພະຍາດຕິດຕໍ່

ໂຣກຫັດ: ຮາຍລະອຽດສໍາລັບຜູ້ພົວພັນ

ຜູ້ພົວພັນແມ່ນຜູ້ທີ່ຫາຍໃຈເອົາອາກາດ ຢູ່ບ່ອນດຽວກັນກັບຄົນທີ່ເປັນໂຣກຫັດ. ຜູ້ພົວພັນບາງຄົນທີ່ບໍ່ມີພູມຕ້ານທານ ອາດຕິດເຊື້ອໄດ້ ນອກຈາກວ່າເຂົາເຈົ້າ ຈະໄດ້ຮັບການປິ່ນປົວທີ່ປ້ອງກັນໄວ້ກ່ອນ.

ຂໍ້ສັງເກດສໍາລັບເຈົ້າໜ້າທີ່ດູແລສຸຂພາບ

- ຮາຍລະອຽດຢູ່ໃນເຈ້ຍຂໍ້ມູນຕ້ອງແມ່ນເຈົ້າໜ້າທີ່ດູແລສຸຂພາບເປັນຜູ້ຕື່ມໃຫ້ສໍາລັບຄົນເຈັບ ແຕ່ລະ ຄົນ (ວັນທີ່ໄດ້ຮັບເຊື້ອ, ໃຫ້ບອກດ້ວຍວ່າໄດ້ສັກ MMR ຫຼື NHIG ໃຫ້, ແລະໃຫ້ຕິກາເລກປະຈຳຕົວແພດໃສ່)
- ທ່ານຕ້ອງໄດ້ເອົາເຈ້ຍຂໍ້ມູນເື່ອງໂຣກຫັດ ຂອງກະຊວງສາທາລະນະສຸກແຫ່ງຣັດ ນຊວ ໃຫ້ຜູ້ພົວພັນດ້ວຍ: www.health.nsw.gov.au/factsheets/infectious/measles.html

1. ວັນທີ ທີ່ພົວພັນກັບຄົນທີ່ມີເຊື້ອໂຣກຫັດ: _____

2. ໃຫ້ຮະວັງຕິດຕາມເບິ່ງອາການຂອງໂຣກຫັດຈົນຮອດວັນທີ: _____

3. ທ່ານໄດ້ຮັບການປິ່ນປົວດັ່ງກ່າວນີ້ໃນການປ້ອງກັນໂຣກຫັດ:

- ຢາວັກຊີນກັນໂຣກຫັດ, ໂຣກໝາກເບີດ, ໂຣກຮູແບລລາ (**MMR**) ຫຼັງຈາກໄດ້ພົວພັນກັບໂຣກຫັດ ຢາວັກຊີນ MMR ເຮັດໃຫ້ຮ່າງກາຍສາມາດຜລິດພູມຕ້ານທານຂອງຮ່າງກາຍ ເພື່ອຕ້ານກັບໂຣກຫັດ ແລະ ສາມາດ ປ້ອງກັນພະຍາດບໍ່ໃຫ້ເຕີບໂຕ ຖ້າວ່າໄດ້ສັກພາຍໃນ 72 ຊົ່ວໂມງຫຼັງຈາກທີ່ໄດ້ພົວພັນກັບເຊື້ອໄວຣັສນີ້. ຢາວັກຊີນMMR ບໍ່ແມ່ນວ່າຈະເໝາະສົມຕໍ່ທຸກໆຄົນ. ແມ່ຍິງຖືພາແລະຜູ້ທີ່ພູມຕ້ານທານ ນຕໍ່ບໍ່ຄວນສັກຢາ MMR.
- ສັກຢາ **Normal Human Immunoglobulin (NHIG)** ຫຼັງຈາກໄດ້ພົວພັນກັບໂຣກຫັດ Normal human immunoglobulin (NHIG) ແມ່ນພູມຕ້ານທານຊຶ່ງກັນອອກມາຈາກເລືອດທີ່ຄົນ ບໍ່ຮິຈາກ. NHIG ສາມາດໃຫ້ການປ້ອງກັນລະຍະສັ້ນຕໍ່ການຕິດເຊື້ອຖ້າຫາກວ່າໄດ້ສັກພາຍໃນ 7 ມື້ຫຼັງຈາກໄດ້ພົວພັນກັບເຊື້ອໂຣກ. NHIG ບໍ່ສາມາດໃຫ້ການປ້ອງກັນລະຍະຍາວ. ຂໍແນະນຳໃຫ້ສັກ MMR ແຕ່ວ່າຄວນໂຈະໄວ້ເປັນເວລາ 5 ເດືອນ ຫຼັງຈາກສັກ NHIG.
- ບໍ່ມີການປິ່ນປົວຫຼັງຈາກພົວພັນກັບໂຣກຫັດແລ້ວ ຖ້າຫາກວ່າໂຣກຫັດໄດ້ເກີດຂຶ້ນກວ່າ 7 ວັນມາແລ້ວ, MMR ແລະ NHIG ແມ່ນໃຊ້ບໍ່ໄດ້ຜົນ. ທ່ານຄວນສັງເກດ ເບິ່ງ ວ່າມີອາການຂອງໂຣກຫັດເກີດຂຶ້ນບໍ່.

ຮາຍລະອຽດທົ່ວໄປສຳລັບຜູ້ພົວພັນ

ຜູ້ພົວພັນກັບໂຮກທັດແມ່ນໃຜ?

“ຜູ້ພົວພັນ” ແມ່ນຜູ້ທີ່ຫາຍໃຈເອົາອາກາດຢູ່ບ່ອນດຽວກັນກັບຄົນອື່ນທີ່ກຳລັງຕິດໂຮກທັດຢູ່ (ຕົວຢ່າງ, ຢູ່ໃນຫ້ອງງຽວກັບຄົນ ທີ່ເປັນໂຮກທັດ). ຖ້າວ່າເຊື້ອໂຮກໄດ້ແຜ່ຜາຍໃຫ້ຜູ້ພົວພັນທີ່ບໍ່ມີພູມຕ້ານທານ, ຜູ້ພົວພັນນັ້ນກໍຈະເກີດມີອາການໂຮກທັດໃນລະຫວ່າງ 7 ຫ້າ 18 ມື້ ຫຼັງຈາກທີ່ໄດ້ຫາຍໃນເອົາອາກາດບ່ອນດຽວກັນ.

ຜູ້ພົວພັນຫຼາຍໆຄົນຈະມີພູມຕ້ານທານຢູ່ແລ້ວເພາະວ່າເຂົາເຈົ້າເຄີຍເປັນໂຮກທັດມາກ່ອນຫຼືໄດ້ສັກຢາກັນ ແລະສະນັ້ນຈຶ່ງຈະ ບໍ່ຕິດ ພະຍາດນີ້. ຜູ້ພົວພັນຄົນອື່ນໆທີ່ບໍ່ມີພູມຕ້ານທານອາດຕິດເຊື້ອໄດ້ ແລະອາດຈະນຳເຊື້ອໄປແຜ່ຜາຍເຊື້ອໂຮກຕໍ່ໃຫ້ຄົນອື່ນອີກ. ບາງຄັ້ງ ກໍສາມາດຢຸດການຕິດເຊື້ອໄດ້ໃນກໍລະນີຂອງຄົນທີ່ບໍ່ມີພູມຕ້ານທານ - ໂດຍການສັກຢາວັກຊີນ MMR ຫຼືໂດຍການສັກຢາ normal human immunoglobulin (NHIG) ໃຫ້.

ແມ່ນໃຜແດ່ທີ່ສູງສຸດການຕິດເຊື້ອນີ້?

ໂຮກທັດແມ່ນໂຮກທີ່ເປັນກັນແຜ່ຫຼາຍກ່ອນປີ 1966, ເພາະສະນັ້ນຄົນທີ່ເກີດກ່ອນນັ້ນແມ່ນມີພູມຕ້ານທານ.

ພວກທີ່ສູງສຸດການຕິດເຊື້ອຮວມມີ:

- ຄົນທີ່ເກີດລະຫວ່າງຫຼືຫຼັງຈາກປີ 1966 ຊຶ່ງບໍ່ເຄີຍເປັນໂຮກທັດມາກ່ອນແລະບໍ່ໄດ້ສັກຢາວັກຊີນ MMR ສອງຄັ້ງ ເມື່ອອາຍຸໄດ້ 12 ເດືອນ.
- ຄົນທີ່ມີລະບົບພູມຕ້ານທານອ່ອນແອ (ເຊັ່ນ ຄົນທີ່ໄດ້ຮັບການປິ່ນປົວມະເຮັງແບບ chemotherapy ຫຼື radiotherapy ຫຼືຄົນທີ່ກິນຢາສເຕຣອຍແບບແຮງ) ເຖິງແມ່ນວ່າເຂົາຈະໄດ້ສັກຢາເຕັມຊຸດແລ້ວຫຼືເຄີຍເປັນໂຮກທັດມາກ່ອນແລ້ວກໍຕາມ.

ຜູ້ພົວພັນຕ້ອງເຮັດຫຍັງແດ່?

- ໃຫ້ສັງເກດເບິ່ງວ່າຈະມີອາການຂອງໂຮກທັດບໍ່ຈົນກວ່າຈະຮອດມື້ທີ່ຂຽນບອກໄວ້ຢູ່ທາງໜ້າຂອງເຈ້ຍໃບນີ້. ອາການຕົ້ນໆ ຂອງໂຮກທັດແມ່ນ ເປັນໄຂ້, ຂີ້ມູກຍ້ອຍ, ຕາແດງແລະນ້ຳຕາໄຫຼ ແລະ ໄອ. ສ່ວນຜື່ນນັ້ນຈະເກີດຫຼັງ.
- ເພື່ອຄວາມຮະມັດຮະວັງ, ເປັນການດີທີ່ທ່ານຄວນຫຼີກເວັ້ນບໍ່ໃກ້ຊິດກັບຄົນທີ່ອາດສູງສຸດການຕິດເຊື້ອຈົນກວ່າວ່າ 18ມື້ ຈະ ຜ່ານໄປຫຼັງຈາກທ່ານຕິດເຊື້ອ. ຖ້າທ່ານບໍ່ສາມາດຫຼີກເວັ້ນການພົວພັນກັບຄົນເຫຼົ່ານັ້ນໄດ້ກໍຕ້ອງ ໄດ້ໃຫ້ເຂົາເຈົ້າຮູ້ວ່າທ່ານ ເປັນໂຮກທັດຢູ່.


ຖ້າທ່ານ (ຫຼືລູກຂອງທ່ານ) ມີອາການຂອງໂຮກຫັດ

- ຢ່າໄປບ່ອນສາທາລະນະຊົນ (ເຊັ່ນບ່ອນເຮັດວຽກ, ໂຮງຮຽນ, ສູນຝາກເດັກ ຫຼື ສູນການຄ້າ) ຫຼືໃຊ້ຮົດໂດຍສານ.
- ໃຫ້ໄປຫາໝໍ, ຖ້າເປັນໄປໄດ້ໃຫ້ໄປຫາໝໍປະຈຳຄອບຄົວ, ໂດຍດ່ວນທີ່ສຸດເພື່ອຢັ້ງຢືນການກວດຫາພະຍາດ. ໃຫ້ຖືເອົາເຈ້ຍນີ້ໄປໃຫ້ ທ່ານໝໍເບິ່ງນຳ.
- ໃຫ້ໂທຣະສັບຫາຄລິນິກທ່ານໝໍກ່ອນໜ້າຈະໄປຮອດເພື່ອເຕືອນໃຫ້ເຂົາເຈົ້າຮູ້ເຖິງອາການຂອງທ່ານ ແລະ ເພື່ອໃຫ້ເວລາ ເຂົາເຈົ້າຈັດແຈງບ່ອນໄວ້ຖ້າເພື່ອຈະໄດ້ກວດເບິ່ງທ່ານຢ່າງປອດພິດ ແລະ ບໍ່ໃຫ້ເອົາເຊື້ອໄປຕິດຄົນອື່ນ.
- ໃຫ້ໂທຣະສັບຫາໜ່ວຍສາທາລະນະສຸກ ຕາມເລກໂທຣະສັບຂ້າງລຸ່ມນີ້.

ຖ້າຕ້ອງການຮາຍລະອຽດເພີ່ມເຕີມ

- ເຈ້ຍຂໍ້ມູນທົ່ວໄປກ່ຽວກັບໂຮກຫັດມີທີ່:
<http://www.health.nsw.gov.au/factsheets/infectious/measles.html>

ຮາຍລະອຽດເພີ່ມເຕີມ - ຜແນກສາທາລະນະສຸກແຫ່ງຣັດ NSW



1300 066 055

www.health.nsw.gov.au