

ເຈ້ຍຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບພະຍາດຕິດຕໍ່

ໂຮກຫັດ

ໂຮກຫັດແມ່ນພະຍາດຮ້າຍແຮງຊຸມິດນຶ່ງ ຊຶ່ງແຜ່ຜ່າຍໄດ້ໂດຍງ່າຍທາງອາກາດ. ການສັກຢາປ້ອງກັນແມ່ນວິທີທີ່ໄດ້ຜົນໃນການປ້ອງກັນໂຮກນີ້. ເດັກນ້ອຍແລະ ຜູ້ໃຫຍ່ທຸກຄົນທີ່ເກີດເມື່ອປີ 1966 ຫຼື ຫຼັງ ຈາກນັ້ນຕ້ອງສັກຢາ ວັກຊີນ MMR ສອງ ຄັ້ງຖ້າວ່າຍັງບໍ່ທັນມີພູມ ຕ້ານທານເທື່ອ.

ໂຮກຫັດແມ່ນຫຍັງ?

ໂຮກຫັດແມ່ນໂຮກຈາກໄວຣັສຊຸມິດນຶ່ງຊຶ່ງອາດເຮັດໃຫ້ໂຮກແຊກຊ້ອນທີ່ຮ້າຍແຮງໄດ້. ໃນອະດີດ, ມີເດັກນ້ອຍ ເປັນ ໂຮກຫັດກັນຢ່າງ ແຜ່ຫຼາຍ. ປັດຈຸບັນນັ້ນ ຄົນທີ່ເປັນໂຮກຫັດໃນຮັດ ນຊວ ມີນ້ອຍທີ່ສຸດເພາະວ່າ ໄດ້ການສັກຢາປ້ອງກັນ.

ໂຮກນີ້ມີອາການຫຍັງແດ່?

- ອາການແຕ່ຕົ້ນໆແມ່ນ ເປັນໄຂ້, ເມື່ອຍອ່ອນເພ້ຍ, ໄອ, ຂີ້ມູກຍ້ອຍ, ຕາເຈັບແລະແດງ ແລະ ຮູ້ສຶກບໍ່ສະບາຍ. ສອງສາມມື້ຕໍ່ມາ ຜິ່ນກໍຈະປາກົດຂຶ້ນ. ຜິ່ນຈະເລີ່ມຂຶ້ນທີ່ໃບໜ້າກ່ອນ ແລ້ວຈະລາມ ໄປຕາມຮ່າງກາຍແລະເປັນຢູ່ ລະຫວ່າງ 4-7 ມື້.
- ຈຳນວນຮອດນຶ່ງສ່ວນສາມຂອງຄົນທີ່ເປັນໂຮກຫັດຈະມີອາການແຊກຊ້ອນ. ອາການດັ່ງກ່າວຮວມມີ ການຕິດເຊື້ອທີ່ຫຼຸ, ຖອກທ້ອງ ແລະ ປອດບວມ, ແລະອາດຕ້ອງໄດ້ນອນໂຮງໝໍ. ປະມານນຶ່ງໃນທຸກໆ 1000 ຄົນທີ່ເປັນໂຮກຫັດ ຈະເປັນໂຮກສມອງອັກເສບ (ສມອງບວມ).

ໂຮກນີ້ແຜ່ຜ່າຍໄດ້ຢ່າງໃດ?

- ຕາມປົກກະຕິ ໂຮກຫັດຈະແຜ່ຜ່າຍ ເມື່ອຄົນຜູ້ນຶ່ງຫາຍໃຈເອົາເຊື້ອໄວຣັສໂຮກຫັດຈາກການ ໄອຫຼືຈາມຂອງຄົນທີ່ມີເຊື້ອ. ໂຮກຫັດແມ່ນນຶ່ງໃນຈຳພວກໂຮກທີ່ແຜ່ຜ່າຍກັນໄດ້ງ່າຍທີ່ສຸດ ໃນການຕິດເຊື້ອຂອງມວນມະນຸດ. ພຽງແຕ່ເຮົາຢູ່ໃນຫ້ອງດຽວ ກັບຄົນທີ່ເປັນໂຮກຫັດກໍອາດເຮັດ ໃຫ້ເຮົາຕິດໂຮກໄດ້.

- ຄົນທີ່ເປັນໂຮກທັດສ່ວນຫຼາຍແມ່ນຕິດເຊື້ອ ພໍດີ ກ່ອນອາການເລີ່ມຕົ້ນຈົນເຖິງສີ່ມື້ຫຼັງຈາກຜື່ນປາກົດຂຶ້ນ. ຈາກຊ່ວງລະຍະ ຕອນຄົນເລີ່ມໄດ້ຮັບເຊື້ອມາເຖິງຕອນເຈັບປ່ວຍປົກກະຕິແມ່ນປະມານ10ມື້. ສ່ວນຫຼາຍ ຜື່ນຈະປາກົດຢູ່ປະມານ 14 ມື້ຫຼັງຈາກໄດ້ຮັບເຊື້ອ.

ແມ່ນໃຜແດ່ສູງຕໍ່ການຕິດເຊື້ອໂຮກນີ້?

ໂຮກທັດເປັນກັນຫຼາຍກ່ອນ ປີ 1966, ເພາະສະນັ້ນ ຄົນທີ່ເກີດກ່ອນນັ້ນແມ່ນມີພູມຕ້ານທານແລ້ວ.

ຄົນທີ່ສູງຕໍ່ການຕິດເຊື້ອຮວມມີ:

- ຄົນທີ່ເກີດລະຫວ່າງປີ1966 ຫຼືຫຼັງຈາກນັ້ນແລະຜູ້ທີ່ບໍ່ໄດ້ສັກຢາວັກຊີນ ກັນ ໂຮກທັດ-ໂຮກໝາກເບີດ-ໂຮກຮູແບລລ້າ (MMR) ສອງຄັ້ງຈາກອາຍຸ 12 ເດືອນ.
- ຄົນທີ່ມີລະບົບພູມຕ້ານທານອ່ອນແອ (ເຊັ່ນຜູ້ທີ່ເຮັດການປົວມະເຮັງແບບຄີໂມ chemotherapy ຫຼື ປົວແບບສາຍແສງ radiotherapy ຫຼືຜູ້ທີ່ກິນຢາສະເຕຣອຍແບບແຮງ) ເຖິງແມ່ນວ່າເຂົາເຈົ້າຈະ ເຄີຍສັກຢາປ້ອງກັນເຕັມສ່ວນ ຫຼື ເຄີຍເປັນ ໂຮກທັດມາກ່ອນກໍຕາມ.
- ຄົນທີ່ບໍ່ໄດ້ສັກຢາກັນແລະເດີນທາງໄປຕ່າງປະເທດ.

ຈະປ້ອງກັນໂຮກນີ້ໄດ້ຢ່າງໃດ?

- ການປ້ອງກັນໂຮກທັດທີ່ດີທີ່ສຸດກໍຄື ສັກຢາວັກຊີນ MMR ປ້ອງກັນສອງຄັ້ງ. ຢາວັກຊີນນີ້ຊ່ວຍປ້ອງກັນການຕິດໂຮກທັດ, ໃນຂະນະດຽວກັນກໍຊ່ວຍປ້ອງກັນໂຮກໝາກເບີດແລະໂຮກຮູແບລລ້າດ້ວຍ.
- ຢາວັກຊີນ MMR ຄວນສັກໃຫ້ເດັກນ້ອຍຕອນອາຍຸ 12 ເດືອນແລະສັກອີກເທື່ອທີສອງເມື່ອອາຍຸ 4 ປີ.
- ຄົນໃດທີ່ເກີດລະຫວ່າງປີ 1966 ຫຼືຫຼັງຈາກນັ້ນ ແລະ ບໍ່ເຄີຍເປັນໂຮກທັດມາກ່ອນ ຫຼື ບໍ່ເຄີຍສັກຢາວັກຊີນ MMR ມາກ່ອນ ຕ້ອງໄດ້ສັກຢາວັກຊີນ MMR ສອງຄັ້ງ ຢ່າງນ້ອຍ ຫ່າງກັນ ສີ່ອາທິດ.
- ເປັນການປອດພ້ອມທີ່ຈະສັກຢາວັກຊີນເກີນສອງຄັ້ງ, ເພາະສະນັ້ນຜູ້ທີ່ບໍ່ໝັ້ນໃຈຄວນໄປສັກເຜື້ອໄວ້.
- ຄົນທີ່ເປັນໂຮກທັດຄວນຢູ່ບ້ານ ຈົນກວ່າວ່າຕົນບໍ່ມີເຊື້ອແລ້ວ (ໝາຍເຖິງວ່າ ຈົນກວ່າຮອດ 4 ມື້ຫຼັງຈາກຜື່ນ ເລີ່ມອອກ)
- ສໍາລັບຄົນທີ່ບໍ່ໄດ້ສັກຢາປ້ອງກັນມາກ່ອນແລະໄດ້ພົວພັນກັບຄົນທີ່ເປັນໂຮກທັດ, ບາງເທື່ອກໍຍັງສາມາດປ້ອງ ກັນການຕິດເຊື້ອໄດ້ດ້ວຍການສັກຢາວັກຊີນ MMR ຖ້າວ່າສັກພາຍໃນ 3 ມື້ຫຼັງຈາກໄດ້ຮັບເຊື້ອ ຫຼື ໃຫ້ immunoglobulin ພາຍໃນ 7 ມື້ຫຼັງຈາກໄດ້ຮັບເຊື້ອ.

ຈະກວດຫາພະຍາດນີ້ໄດ້ຢ່າງໃດ?

- ຄວນສົງສັຍວ່າແມ່ນໂຮກທັດຖ້າຄົນຜູ້ນຶ່ງຮູ້ສຶກບໍ່ສະບາຍ, ເປັນໄອ, ຂີ້ມູກຍ້ອຍ ຫຼື ເຈັບຕາ ແລະ ເປັນໄຂ້ ຕິດຕາມດ້ວຍການເປັນຜື່ນ.
- ຍາມໃດທີ່ມີການສົງສັຍວ່າເປັນໂຮກທັດ, ຄວນກວດເລືອດແລະຄວນເອົາຕົວຢ່າງຈາກດັງ, ຮູຄໍ ແລະ ປັດສະວະ ເພື່ອຢັ້ງຢືນວ່າແມ່ນພະຍາດນີ້. ການຢັ້ງຢືນພະຍາດເປັນສິ່ງສໍາຄັນເພາະວ່າທາງການສາທາ ຣະນະສຸກ ຈະໄດ້ຕິດຕາມເບິ່ງຄົນອື່ນໆທີ່ອາ ດສູງຕໍ່ການຕິດໂຮກທັດນີ້. .

ຈະປິ່ນປົວໂຮກນີ້ໄດ້ຢ່າງໃດ?

- ຕາມປົກກະຕິ ທ່ານໝໍຈະແນະນຳໃຫ້ຄົນທີ່ເປັນໂຮກຫັດພັກຜ່ອນ, ດື່ມນ້ຳຫຼາຍໆ, ແລະກິນຢາ paracetamol ເພື່ອປົວອາການໄຂ້. ບໍ່ມີການປິ່ນປົວສະເພາະສຳລັບໂຮກນີ້.
- ໃນລະຫວ່າງທີ່ຄົນຜູ້ນຶ່ງເປັນໂຮກຫັດ ເປັນສິ່ງສຳຄັນທີ່ລາວຕ້ອງຢູ່ເຮືອນ ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນການແຜ່ຜາຍເຊື້ອໂຮກໄປໃຫ້ຄົນອື່ນ.

ຜແນກສາທາຣະນະສຸກມີທ່າທີຢ່າງໃດຕໍ່ໂຮກນີ້?


ທ່ານໝໍ, ໂຮງໝໍ, ຫ້ອງທົດລອງ, ໂຮງຮຽນແລະສູນຝາກເດັກຕ້ອງລາຍງານກໍຣະນີຂອງໂຮກຫັດໃຫ້ທາງໜ່ວຍສາທາຣະນະສຸກຊາບ. ພະນັກງານຂອງໜ່ວຍສາທາຣະນະສຸກຈະສຳພາດທ່ານໝໍແລະຄົນເຈັບ (ຫຼືຜູ້ດູແລ) ເພື່ອໃຫ້ຮູ້ວ່າການຕິດເຊື້ອເກີດຂຶ້ນຢ່າງໃດ, ມີຄົນອື່ນຄົນໃດແດ່ທີ່ສ່ຽງຕໍ່ການຕິດເຊື້ອ, ນຳໃຊ້ມາດຕະການຄວບຄຸມ (ເຊັ່ນສັກຢາປ້ອງກັນ ແລະ ສັ່ງຫ້າມບໍ່ໃຫ້ໄປໂຮງຮຽນ ຫຼືໄປເຮັດວຽກ) ແລະໃຫ້ຄຳແນະນຳອັນຄວນ.

ຖ້າຕ້ອງການຮາຍລະອຽດເພີ່ມເຕີມ

ເຈ້ຍຂໍ້ມູນ "ໂຮກຫັດ: ຮາຍລະອຽດສຳລັບຜູ້ພົວພັນ" ໄດ້ບັນຈຸຂໍ້ມູນຈຳເພາະສຳລັບຜູ້ທີ່ຕິດເຊື້ອໄວຣັສແລ້ວ. ເຂົ້າໄປເບິ່ງຮາຍລະອຽດໄດ້ທີ່:

http://www.health.nsw.gov.au/resources/publichealth/infectious/diseases/measles_contact_factsheet_pdf.asp

ຮາຍລະອຽດເພີ່ມເຕີມ - ຜແນກສາທາຣະນະສຸກແຫ່ງຣັດ NSW



1300 066 055

www.health.nsw.gov.au