

برگه اطلاعاتی درباره بیماری‌های مسری

بیماری نیوموکوکی

عفونت با باکتری نیوموکوکی باعث یک سری بیماری‌ها می‌شود، از جمله منژیت، سینه پهلو و عفونت گوش میانی. این عفونت‌ها در زمستان و بهار رایج ترند. کودکان کوچک و سالمدان بیشتر از همه در خطرند. عفونت با آنتی بیوتیک درمان می‌شود. این سازی می‌تواند از عفونت جلوگیری کند.

بیماری نیوموکوکی چیست؟

بیماری نیوموکوکی در اثر آلودگی به باکتری *Streptococcus pneumoniae* به وجود می‌آید. عفونت می‌تواند باعث انواع بیماری‌ها شود از جمله سینه پهلو (عفونت شش‌ها)، آماس گوش (عفونت گوش میانی) و منژیت (عفونت غشاء دور مغز و نخاع).

نشانه‌های آن چیستند؟

- نشانه‌ها به محل عفونت و سن شخص بستگی دارند.
- سینه پهلو می‌تواند باعث کم نفسی، تب، کمبود انرژی، کم اشتہایی، سر درد، درد سینه و سرفه شود.
- آماس گوش می‌تواند باعث گریه، کشیدن گوش با دست، تب، بد خلقی، ضعف شناوری و بعضی وقتها اسهال و استفراغ شود.
- منژیت می‌تواند باعث تب، سر درد، سفتی گردن، تهوع، استفراغ و خواب آلودگی شود.

چگونه پخش می‌شود؟

این باکتری اغلب بدون آزار در گلوبال اشخاص سالم زندگی می‌کند. گهگاهی این باکتری باعث عفونت می‌شود.

چه کسی در خطر است؟

کسانی که بیش از همه در خطر عفونت هستند عبارتند از:

- کودکان کوچکتر از دو ساله
- بزرگسالان سالخورده
- بومیان و جزیره نشینان تنگه تارس
- کسانی که بیماری شش، بیماری قلبی، سرطان، بیماری کلیه، عفونت HIV یا سوء تغذیه دارند
- کسانی که طحالشان برداشته شده است یا درست کار نمی‌کند
- کسانی که سیگار می‌کشند.

عفونت نیوموکوکی در زمستان و اوایل بهار بیشتر رایج است. همه گیری‌های آن در مراکز مراقبت از کودکان، خانه‌های سالمدان و موسسات دیگر دیده شده است.

چگونه از آن جلوگیری می‌شود؟

کودکان

واکسن نیوموکوکی برای همه کودکان در دو، چهار و شش ماهگی توصیه می‌شود و رایگان است.

این واکسن برای کودکان دو تا پنج ساله که در یکی از شرایط زیر هستند نیز رایگان است:

- با بعضی کمبودهای سیستم دفاعی به دنیا آمده‌اند
- داروهای بخصوصی را مصرف می‌کنند یا تحت درمان با اشعه هستند
- کسانی که طحال ندارند یا طحالشان درست کار نمی‌کند
- عفونت HIV
- ناراحتی مزمن کلیه
- نشانگان داون
- بیماری قلبی که باعث برقان ازرق یا از کار افتادن قلب شود
- نوزادان نارس با بیماری مزمن شش
- نوزادانی که بعد از کمتر از 28 هفته بارداری متولد شده‌اند
- فساد الیاف کیسه صفرا
- مرض قند محتاج به انسولین
- نشت مایعات اطراف مغز و نخاع
- شنت‌های درون جمجمه‌ای یا دستگاههای کاشته در حلزون گوش

برای کودکانی که در شرایط پزشکی بالا هستند، واکسن مجدد در 12 ماهگی توصیه می‌شود و یک دوز واکسن بزرگسالان در پنج سالگی توصیه می‌شود. لطفاً در این مورد با دکتر محلی خود گفتگو کنید.

واکسن نیوموکوکی برای اشخاص زیر نیز رایگان است:
بزرگسالان

- کسانی که 65 ساله یا مسن‌تر هستند
- بومیان و جزیره نشینان تنگه تارس که 50 ساله یا مسن‌تر هستند و آنهایی که 15 تا 49 سال دارند و:
 - بیماری قلب، کلیه یا شش دارند
 - آسم یا مرض قند دارند
 - سیستم دفاعی آنان ضعیف شده است
 - مشروب زیاد می‌خورند یا سیگار می‌کشند.

برای بعضی از اشخاص که در بیشترین خطر ابتلا به بیماری شدید هستند، درمان مداوم با آنتی بیوتیک نیز ممکن است توصیه شود.

اگر کسی اولین واکسن را در سن 65 سالگی یا بالاتر زده است، واکسن مجدد آن پس از 5 سال توصیه می‌شود.

واکسن زدن برای کسانی که 15 تا 64 ساله هستند و در هر یک از شرایط زیر هستند نیز توصیه می‌شود:

- سیستم دفاعی شان ضعیف است
- طحالشان برداشته شده یا درست کار نمی‌کند
- بیماری مزمن دارند (مثلًا بیماری قلب، کلیه، شش، مرض قند، یا بیماری‌های مربوط به الک)
- نشت مایعات اطراف مغز و نخاع
- سیگار می‌کشند

برای این اشخاص یک واکسن مجدد در 65 سالگی یا 10 سال بعد از واکسن اول (هر کدام دیر تر باشد) توصیه می‌شود.

چگونه تشخیص داده می‌شود؟

دکترتان می‌تواند بیماری نیوموکوکی از روی نشانه‌های آن، یک معاینه و با چند آزمایش تشخیص دهد. آزمایشات ممکن است شامل عکسبرداری از سینه و نمونه برداری برای پیدا کردن باکتری در قسمت آلوده شده بدن شما (مثلًا خون یا مایعات اطراف مغز و نخاع) باشد.


چگونه درمان می‌شود؟

درمان شامل آنتی بیوتیک، دارو برای کنترل تب و درد و مایعات برای جلوگیری از کم شدن آب بدن می‌باشد.

پاسخ بهداشت عمومی چیست؟

آزمایشگاهها باید بصورت محرمانه موارد بیماری نیوموکوکی هجوم آورنده (که در آن باکتری در داخل خون یا محل استرلیزه دیگری از بدن واقع شده است) را به واحد محلی بهداشت عمومی گزارش دهند. کارمندان واحد بهداشت عمومی با دکتر درمان کننده و بیمار یا شخص مراقب او صحبت می‌کنند تا عوامل خطری را که بیمار ممکن است داشته باشد مشخص کنند و تاریخچه واکسیناسیون او را بپرسند. کسانی که با بیمار تماس نزدیک دارند معمولاً در خطر بیشتری برای عفونت نیستند و نیازی به پیگیری ندارند. اطلاعات درباره تعداد کسانی که بیماری نیوموکوکی می‌گیرند و عوامل خطر آنها به پیدا کردن راههای بهتری برای جلوگیری از این بیماری کمک می‌کند.

اطلاعات بیشتر – واحدهای بهداشت عمومی در نیو سات ولز



1300 066 055

www.health.nsw.gov.au