

ប័ណ្ណព័ត៌មានអំពីជំងឺឆ្លង

ជំងឺស្លូថ

ជំងឺស្លូថគឺជាជំងឺឆ្លងដោយការឆ្លងវិរុសមួយប្រភេទ។ ជាធម្មតាជំងឺនេះមានភាពមិនសូវធ្ងន់ធ្ងរទេ ប៉ុន្តែអាចបង្កការខូចខាតខ្លាំងក្លាដល់ទារកក្នុងផ្ទៃ។ ការចាក់ថ្នាំបង្ការរោគគួរធ្វើឡើងចំពោះកុមារទាំងអស់នៅពេលមានអាយុ 12 ខែ និង 4 ឆ្នាំ។ ស្ត្រីទាំងអស់ដែលគ្រោងមានផ្ទៃពោះ គួរតែកមើលប្រព័ន្ធការពាររបស់ខ្លួនទល់នឹងរោគនេះសិន។

កែតម្រូវចុងក្រោយ៖ ថ្ងៃទី 15 ខែមករា ឆ្នាំ 2008

តើស្លូថគឺជាជំងឺអ្វី?

- ស្លូថគឺជាជំងឺឆ្លងមួយរបស់មនុស្សដែលបង្កដោយវិរុស។
- ទោះជាជំងឺនេះមានភាពមិនសូវធ្ងន់ធ្ងរចំពោះមនុស្សភាគច្រើនក្តី ក៏ការកើតមានជំងឺនេះនៅពេលមានផ្ទៃពោះ ធ្វើឲ្យអាចបណ្តាលឲ្យមានគុណវិបត្តិធ្ងន់ធ្ងរចំពោះទារកក្នុងផ្ទៃ និងការរលូតកូន។

តើស្ថានភាពជំងឺស្លូថពីកំណើត (congenital rubella syndrome) គឺជាអ្វី?

- ស្ថានភាពជំងឺស្លូថពីកំណើតកើតមានឡើងចំពោះទារកដល់ទៅ 90 ភាគរយ ដែលប្រសូតពីម្តាយដែលកើតជំងឺស្លូថក្នុងអំឡុងពេលមានផ្ទៃពោះ បីខែដំបូង។
- ស្ថានភាពជំងឺស្លូថពីកំណើតអាចបណ្តាលឲ្យមានគុណវិបត្តិដល់ទារកក្នុងផ្ទៃ ដោយមានរួមទាំងបញ្ហាខូចបេះដូង ផ្តង់ការខូចខាតខួរក្បាល និងបញ្ហាភ្នែក ដោយមានរួមទាំងភ្នែកឡើងបាយទៀតផង។

តើជំងឺនេះមានរោគសញ្ញាអ្វីខ្លះ?

- រោគសញ្ញានៃជំងឺស្លូថអាចមានរួមទាំងគ្រុនក្តៅមិនសូវខ្លាំង កន្ទួល ហៀរសំបោរ ឈឺចំពង់ក និងជាញឹកញយហើមកូនកណ្តុរ។ ការឈឺសន្តាក់ក៏កើតមានជាទូទៅផងដែរ ជាពិសេសចំពោះស្ត្រី។
- នៅក្នុងករណីកំរ ការកើតជំងឺស្លូថអាចបង្កភាពស្មុគស្មាញដោយសារការធ្លាក់ចុះនូវកោសិកាយាម (thrombocytopenia) ដែលអាចបណ្តាលឲ្យមានការចេញឈាម ឬការរលាកខួរក្បាល។

តើជំងឺនេះឆ្លងតាមរបៀបណា?

- ស្លូថឆ្លងពីអ្នកកើតជំងឺនេះតាមរយៈចំហាយទឹកចេញពីច្រមុះ ឬមាត់ ឬតាមរយៈការប៉ះពាល់ដោយផ្ទាល់។ ជំងឺស្លូថឆ្លងយ៉ាងងាយទៅកាន់មនុស្សទាំងឡាយដែលមិនបានចាក់ថ្នាំ ឬមិនធ្លាប់កើតជំងឺនេះ។
- ជាធម្មតា រយៈពេលចាប់ពីពេលប៉ះពាល់នឹងមេរោគរហូតដល់ពេលកើតមានជំងឺគឺពី 14 ទៅ 21 ថ្ងៃ។ ជាធម្មតាអ្នកកើតស្លូថកើតមានជំងឺនេះចាប់ពីពេលប្រាំពីរថ្ងៃមុនពេលកន្ទួលកើតមានឡើង រហូតដល់ពេលបួនថ្ងៃក្រោយមកទៀត។

តើអ្នកណាខ្លះដែលអាចមានគ្រោះថ្នាក់កើតជំងឺនេះ?

ជនរាល់រូបដែលមិនស្រាវជ្រាវជំងឺនេះ (តាមរយៈការកើតមាននៅពេលកន្លងមក ឬការចាក់ថ្នាំបង្ការរោគ) មានគ្រោះថ្នាក់កើតជំងឺស្នូច។

តើវិធីបង្ការជំងឺនេះធ្វើឡើងដោយរបៀបណា?

- អ្នកកើតស្នូចគួរស្នាក់នៅក្នុងផ្ទះរយៈពេលយ៉ាងតិចបួនថ្ងៃ ក្រោយពីចេញកន្លែង និងចៀសវាងការប៉ះពាល់អ្នកដែលមិនស្រាវជ្រាវជំងឺនេះ។
- វិធីការពារប្រសើរបំផុតទល់នឹងជំងឺស្នូចគឺតាមរយៈការចាក់ថ្នាំបង្ការរោគ MMR ដែលការពារទល់នឹងការឆ្លងជំងឺកញ្ជ្រាវសាឡាទែន និងស្នូច។
- ថ្នាំបង្ការរោគ MMR គួរចាក់ឲ្យកុមារនៅពេលមានអាយុ 12 ខែ និងនៅពេលមានអាយុបួនឆ្នាំ។ ថ្នាំ MMR ចំនួនពីរកំរិតផ្តល់ការការពារទល់នឹងជំងឺស្នូចចំពោះអ្នកចាក់ថ្នាំនេះដល់ទៅជាង 99 ភាគរយ។
- ថ្នាំបង្ការរោគ MMR ជាថ្នាំមានសុវត្ថិភាពនិងប្រសិទ្ធភាព ដែលប្រើទូទាំងពិភពលោកជាច្រើនឆ្នាំមកហើយ។
- នៅក្នុងពេលដែលជនពេញវ័យអាយុច្រើនយ៉ាងច្រើននាក់ស្រាវជ្រាវជំងឺស្នូច ដោយសារតែអ្នកទាំងនោះបានចាក់ថ្នាំកើតរោគនេះនៅពេលនៅក្មេងក្តី ក៏យូរជនពេញវ័យ (ជាពិសេសបុរស) អាចមិនស្រាវជ្រាវជំងឺនេះដែរ។ ការចាក់ថ្នាំបង្ការរោគស្នូចមានសារៈសំខាន់ណាស់ចំពោះស្ត្រី(និងបុរស)ដែលមានអាយុអាចបង្កើតកូនបាន ដើម្បីកាត់បន្ថយឱកាសរបស់ស្ត្រីមានផ្ទៃពោះក្នុងការប៉ះពាល់និងកើតជំងឺស្នូច។
- ជាការសំខាន់ណាស់ដែលស្ត្រីទាំងអស់ដែលគ្រោងមានផ្ទៃពោះ ដឹងថាតើខ្លួនស្រាវជ្រាវជំងឺស្នូចដែរឬទេ។ ស្ត្រីដែលគ្រោងមានផ្ទៃពោះគួរធ្វើតេស្តឈាម ដែលអាចធ្វើដោយវេជ្ជបណ្ឌិតក្នុងតំបន់របស់ខ្លួន ដើម្បីឆែកមើលថា តើខ្លួនស្រាវជ្រាវជំងឺនេះដែរឬទេ។ ស្ត្រីមានផ្ទៃពោះមិនគួរចាក់ថ្នាំបង្ការរោគស្នូចទេ ហើយស្ត្រីគួរចៀសវាងការមានផ្ទៃពោះរយៈពេលមួយខែ ក្រោយពីបានចាក់ថ្នាំបង្ការរោគនេះហើយ។

តើការវិនិច្ឆ័យរោគធ្វើទៅតាមរបៀបណា?

ជំងឺស្នូចអាចលំបាកធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យ ដោយសារតែមានវិរុសច្រើនផ្សេងទៀតដែលបណ្តាលឲ្យមានជំងឺស្រដៀងគ្នា ដែលធ្វើឲ្យមានគ្រុនក្តៅនិងកន្ទួល ។ រោគវិនិច្ឆ័យច្បាស់លាស់តម្រូវឲ្យធ្វើតេស្តឈាម។

តើវិធីព្យាបាលជំងឺនេះធ្វើឡើងដោយរបៀបណា?

ការព្យាបាលរោគសញ្ញានៃជំងឺស្នូចមានរួមទាំងការសំរាក និងការទទួលទានជាតិទឹកឲ្យបានច្រើន។

តើផ្នែកសុខភាពសាធារណៈមានវិធានការឆ្លើយតបអ្វីខ្លះ?

ស្ត្រីមានផ្ទៃពោះដែលបានប៉ះពាល់អ្នកកើតស្នូចគួរទាក់ទងសុខាភិបាលសាធារណៈ។ នៅក្រោមច្បាប់សុខាភិបាលសាធារណៈ មន្ទីរពិសោធន៍ក្នុងរដ្ឋ NSW ត្រូវរាយការណ៍ឲ្យដឹងអំពីការកើតមានជំងឺនេះ។ ផ្នែកសុខភាពសាធារណៈតាមដានស្ថិតិចំនួនករណីដើម្បីតាមពិនិត្យមើលឥទ្ធិពលនៃកម្មវិធីចាក់ថ្នាំបង្ការរោគ និងដើម្បីរកមើលដឹងការឆ្លងរាតត្បាតទាំងឡាយ។

ព័ត៌មានបន្ថែម - ផ្នែកសុខភាពសាធារណៈ (Public Health) នៅក្នុងរដ្ឋ NSW

ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានបន្ថែម សូមទាក់ទងវេជ្ជបណ្ឌិត ផ្នែកសុខភាពសាធារណៈក្នុងតំបន់ ឬមណ្ឌលសុខភាពសហគមន៍របស់លោកអ្នក។ សូមរកមើលនៅក្រោមពាក្យ *NSW Government* នៅផ្នែកខាងមុខនៃសៀវភៅទូរស័ព្ទ *White Pages* ។

តំបន់ទីក្រុង	ទីតាំង	លេខទូរស័ព្ទ	តំបន់ជនបទ	ទីតាំង	លេខទូរស័ព្ទ
Northern Sydney/Central Coast	Hornsby	02 9477 9400	Greater Southern	Goulburn	02 4824 1837
	Gosford	02 4349 4845		Albury	02 6080 8900
South Eastern Sydney/Illawarra	Randwick	02 9382 8333	Greater Western	Broken Hill	08 8080 1499
	Wollongong	02 4221 6700		Dubbo	02 6841 5569
Sydney South West	Camperdown	02 9515 9420		Bathurst	02 6339 5601
Sydney West	Penrith	02 4734 2022	Hunter/New England	Newcastle	02 4924 6477
	Parramatta	02 9840 3603		Tamworth	02 6767 8630
Justice Health Service	Matraville	02 9311 2707	North Coast	Port Macquarie	02 6588 2750
NSW Department of Health	Nth Sydney	02 9391 9000		Lismore	02 6620 7500
NSW Health:		www.health.nsw.gov.au			