

ເຈ້ຍຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບພະຍາດຕິດຕໍ່

ໂຮກໄທຟອຍເກີດຂຶ້ນຍ້ອນການຕິດເຊື້ອ
ຈາກແບັກທີເຣັຍຊຶ່ງເອີ້ນວ່າ
Salmonella Typhi.
ຢູ່ໃນອອສເຕຣເລັຍ ການຕິດເຊື້ອ
ໄທຟອຍສ່ວນຫຼາຍແມ່ນຕິດມາຈາກ
ຕ່າງປະເທດ ແລະເກີດຂຶ້ນຫຼັງຈາກກິນ
ອາຫານຫຼືດື່ມນ້ຳທີ່ມີເຊື້ອໂຮກນີ້ ຢູ່ໃນ
ປະເທດທີ່ມີໂຮກໄທຟອຍເປັນກັນແຜ່ຫຼາຍ.

ໂຮກໄທຟອຍ

ໂຮກໄທຟອຍແມ່ນຫຍັງ?

ໂຮກໄທຟອຍເກີດຂຶ້ນຈາກການຕິດເຊື້ອແບັກທີເຣັຍຊຶ່ງເອີ້ນວ່າ *Salmonella Typhi*. ໃນອອສເຕຣເລັຍ, ການຕິດເຊື້ອໂຮກໄທຟອຍສ່ວນຫຼາຍແມ່ນຕິດມາຈາກຕ່າງປະເທດ ແລະ ເກີດຂຶ້ນຫຼັງຈາກກິນອາຫານຫຼື ດື່ມນ້ຳທີ່ມີເຊື້ອໂຮກໃນປະເທດທີ່ຄົນເປັນໄທຟອຍກັນແຜ່ຫຼາຍ. ການຕິດເຊື້ອຊນິດນີ້ບໍ່ແມ່ນຊນິດດຽວກັນກັບ ການຕິດເຊື້ອຈາກ *Salmonella*.

ໂຮກນີ້ມີອາການຢ່າງໃດແດ່?

ຄົນທີ່ເປັນໂຮກໄທຟອຍອາດມີອາການບໍ່ຮຸນແຮງຫຼືອາດຮ້າຍແຮງໄດ້. ອາການຂອງໄຂ້ໄທຟອຍອາດຮວມມີ ອາການໄຂ້, ເຈັບຫົວ, ຮູ້ສຶກບໍ່ສະບາຍທົ່ວໄປ, ກິນເຂົ້າບໍ່ແຊບ, ແລະ ໄອແຫ້ງ. ການເຕັ້ນຂອງຫົວໃຈຊ້າລົງ ແລະ ມ້າມໃຫຍ່ຂຶ້ນ. ບາງຄົນອາດເກີດຈຸດແດງຕາມລຳຕົວ. ບາງເທື່ອກໍອາດທ້ອງຜູກຫຼືຖອກທ້ອງ. ອາການ ຕ່າງໆຈະເລີ່ມຂຶ້ນແຕ່ 1 ຫາ 3 ອາທິດຫຼັງຈາກຕິດເຊື້ອແລ້ວ. ບາງຄົນກໍບໍ່ມີອາການຫຍັງເລີຍ.

ໂຮກນີ້ແຜ່ຜ່າຍຢ່າງໃດ?

ໃນອອສເຕຣເລັຍ, ໂຮກໄທຟອຍແມ່ນຕິດມາຈາກປະເທດກຳລັງພັດທະນາເຊັ່ນອິນໂດເນເຊັຍແລະປະເທດໃນລຸ່ມ ພາກພື້ນອິນເດັຍ. ຄົນສ່ວນຫຼາຍຕິດໂຮກໄທຟອຍຈາກການກິນອາຫານຫຼືດື່ມນ້ຳທີ່ມີເຊື້ອໂຮກຊຶ່ງແຜ່ຜ່າຍ ໂດຍຄົນທີ່ມີພະຍາດນີ້ຢູ່ແລ້ວ, ຮວມທັງຄົນທີ່ມີພະຍາດແຕ່ບໍ່ມີອາການຫຍັງ. ໝາກໄມ້ແລະຜັກດິບ, ນົມ ແລະ ຫອຍກາບ ແມ່ນ ອາຫານທີ່ສ່ວນຫຼາຍມັກກ່ຽວພັນກັບການເຈັບປ່ວຍຈາກພະຍາດນີ້.

ແມ່ນໃຜແດ່ທີ່ສູງຕໍ່ການຕິດພະຍາດນີ້?

ທຸກໆຄົນອາດຕິດພະຍາດໄທຟອຍນີ້ໄດ້, ຢ່າງໃດກໍດີ ໄດ້ມີຢາວັກຊີນສໍາລັບສັກປ້ອງກັນແລ້ວ ແລະ ຜູ້ທີ່ຈະເດີນທາງໄປປະເທດຊື່ງມີຄົນເປັນໂຮກໄທຟອຍກັນແຜ່ຫຼາຍ ຄວນສັກຢາປ້ອງກັນໄວ້. ທ່ານສາມາດເຂົ້າໄປເບິ່ງຄໍາແນະນໍາສໍາລັບຜູ້ເດີນທາງໄດ້ທີ່ສູນຄວບຄຸມພະຍາດ ທີ່ ເວັບໄຊຕ໌ (www.cdc.gov).

ຄົນໃນຄອບຄົວ ຫຼື ຜູ້ທີ່ໄດ້ເດີນທາງໄປກັບຄືນທີ່ຕິດພະຍາດໄທຟອຍ ຈະໄດ້ຖືກກວດກາຫາໂຮກໄທຟອຍຈາກ ຜແນກສາທາຣະນະສຸກໃນເຂດທ້ອງຖິ່ນຂອງຕົນ. ຜູ້ທີ່ໄດ້ພົວພັນກັບຄົນເປັນພະຍາດຄວນຮູ້ເຖິງອາການຂອງໂຮກໄທຟອຍແລະຄວນໄປຫາໝໍປະຈໍາ ຄອບຄົວຖ້າມີອາການຂອງໂຮກເກີດຂຶ້ນ.

ຈະປ້ອງກັນໂຮກນີ້ໄດ້ຢ່າງໃດ?

ຜູ້ທີ່ຈະເດີນທາງໄປປະເທດກໍາລັງພັທນາຄວນສັກຢາປ້ອງກັນກ່ອນອອກເດີນທາງ ແລະ:

- ຫຼີກເວັ້ນຈາກການກິນອາຫານທີ່ບໍ່ໄດ້ຕົ້ມສຸກ, ຮວມທັງໝາກໄມ້ ນອກເສ້ຍຈາກວ່າໝາກໄມ້ນັ້ນປອກເປືອກໄດ້
- ຫຼີກເວັ້ນນໍ້າທີ່ບໍ່ໄດ້ກັ່ນໃຫ້ສະອາດ, ຮວມທັງນໍ້າກ້ອນນໍ້າ
- ດື່ມນໍ້າຈາກແກ້ວທີ່ມີຝາອັດ
- ລ້າງມືຫຼັງຈາກເຂົ້າຫ້ອງນໍ້າແລະກ່ອນກິນອາຫານ
- ຫຼີກເວັ້ນຈາກການກິນອາຫານຕາມຮ້ານຂ້າງທາງ
- ໃຫ້ໝັ້ນໃຈວ່າອາຫານຮ້ອນນັ້ນໄດ້ມີການທຸງຕົ້ມຈົນສຸກດີແລະໃຫ້ກິນອາຫານນັ້ນໃນລະຫວ່າງທີ່ມັນຍັງຮ້ອນຢູ່.

ຖ້າເດີນທາງພາຍໃນປະເທດອອສເຕຣເລັຍກໍບໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງສັກຢາປ້ອງກັນ.

ຄົນທີ່ເປັນໂຮກໄທຟອຍ, ຫຼືຄົນທີ່ຢູ່ເຮືອນດຽວກັນກັບຜູ້ທີ່ເປັນໂຮກໄທຟອຍ, ຕ້ອງບໍ່ໄປເຮັດວຽກຖ້າຫາກວ່າວຽກຂອງຕົນ ແມ່ນກ່ຽວຂ້ອງກັບການຈັບບາຍອາຫານ ຫຼື ຕ້ອງດູແລເດັກນ້ອຍ, ຄົນເຈັບ ຫຼື ຄົນຊະຣາ, ແລະບໍ່ຄວນແຕ່ງອາຫານໃຫ້ຄົນອື່ນກິນ. ຕ້ອງໄດ້ເອົາອາຈົມໄປກວດຫຼາຍເທື່ອເພື່ອຈະໄດ້ຮູ້ວ່າທ່ານບໍ່ມີເຊື້ອໂຮກໄທຟອຍແລ້ວ. ຜແນກສາທາຣະນະສຸກທ້ອງຖິ່ນຈະບອກໃຫ້ທ່ານຊາບວ່າເວລາໃດທີ່ທ່ານຈະສາມາດກັບຄືນໄປເຮັດວຽກໄດ້.

ຄົນທີ່ອາດຕິດເຊື້ອມາຈາກແຫຼ່ງດຽວກັນ, ຍົກຕົວຢ່າງ ເດີນທາງໄປຕ່າງປະເທດ, ຈະຖືກບອກໃຫ້ຢຸດເຮັດວຽກກ່ອນ ຖ້າວຽກຂອງເຂົາເຈົ້າກ່ຽວຂ້ອງກັບການຈັບບາຍອາຫານຫຼືດູແລເດັກ, ຄົນເຈັບຫຼືຄົນຊະຣາ. ເຂົາເຈົ້າກໍຕ້ອງໄດ້ເອົາອາຈົມໄປກວດເຊັ່ນກັນ.

ເນື່ອງຈາກວ່າເຊື້ອໂຮກໄທຟອຍສາມາດຕິດຢູ່ກັບມື ສະນັ້ນຈຶ່ງເປັນສິ່ງສໍາຄັນຫຼາຍທີ່ເຮົາຕ້ອງລ້າງມືໃຫ້ສະອາດ ຖ້າຖ້ວນຫຼັງຈາກເຂົ້າຫ້ອງນໍ້າ ແລະ ກ່ອນປຸງແຕ່ງອາຫານ. ຄວນລ້າງມືດ້ວຍສະບູແລະນໍ້າຢ່າງນ້ອຍ 15 ວິນາທີ, ໄລອອກ ແລະ ເຊັດມືໃຫ້ແຫ້ງດີ.

ຈະກວດຫາໂຮກນີ້ໄດ້ຢ່າງໃດ?

ເພື່ອກວດຫາເຊື້ອໂຮກໄທຟອຍ, ທ່ານໝໍປະຈໍາຄອບຄົວຂອງທ່ານຫຼືໂຮງໝໍໃນເຂດທ້ອງຖິ່ນຈະສົ່ງຕົວຢ່າງເລືອດຫຼືອາຈົມໄປໃຫ້ທາງຫ້ອງທົດລອງທໍາການວິຈັຍ.


ຈະປິ່ນປົວໂຮກນີ້ໄດ້ຢ່າງໃດ?

ຄົນທີ່ເປັນໂຮກໄທຟອຍອາດຕ້ອງໄດ້ນອນໂຮງໝໍແລະອາດຕ້ອງໄດ້ຮັບການປິ່ນປົວໂດຍໃຊ້ຢາປະຕິຊີວະນະ (antibiotics). ບາງຄົນກໍອາດບໍ່ສ່ຽງແຕ່ອາການຫຍັງເລີຍ ແຕ່ວ່າ ອາດເປັນຜູ້ຖືເຊື້ອໄທຟອຍໃນໂຕ. ຜູ້ທີ່ຖືເຊື້ອກໍຕ້ອງໄດ້ປິ່ນປົວໂດຍການໃຊ້ຢາປະຕິຊີວະນະເຊັ່ນດຽວກັນ.

ຜແນກສາທາຣະນະສຸກມີທ່າທີຢ່າງໃດຕໍ່ໂຮກນີ້?

- ທ່ານໝໍ, ໂຮງໝໍ ແລະ ຫ້ອງທົດລອງ ຕ້ອງລາຍງານກໍຣະນີຂອງໂຮກໄທຟອຍຕໍ່ຜແນກສາທາຣະນະສຸກ ຫ້ອງຖິ່ນ.
- ພະນັກງານຂອງຜແນກສາທາຣະນະສຸກຫ້ອງຖິ່ນຈະສຳພາດທ່ານໝໍຫຼືຄົນເຈັບ (ຫຼືຜູ້ດູແລ) ເພື່ອຄົ້ນຫາ ສາເຫດວ່າການຕິດເຊື້ອເກີດຂຶ້ນຢ່າງໃດ.
- ທາງການຄວບຄຸມອາຫານແຫ່ງຣັດ ນຊວ, ໂດຍການຮ່ວມມືກັບ ກະຊວງສາທາຣະນະສຸກແຫ່ງຣັດ ນຊວ, ມີໜ້າຮັບຜິດຊອບໃນການຕິດຕາມເບິ່ງສະພາບແວດລ້ອມຂອງບ່ອນທີ່ມີການຈັບບາຍອາຫານທີ່ມີ ເຊື້ອໂຮກໄທຟອຍ.
- ຜແນກສາທາຣະນະສຸກໃນເຂດຫ້ອງຖິ່ນຂອງທ່ານສາມາດໃຫ້ຄຳແນະນຳໄດ້ຕື່ມກ່ຽວກັບການຫຼີກເວັ້ນບໍ່ ໄປເຮັດວຽກຫຼືໂຮງຮຽນ. ຜູ້ທີ່ຖືກສັ່ງໃຫ້ຢຸດບໍ່ໄປເຮັດວຽກຕ້ອງໄດ້ເອົາອາຈົມກວດຫຼາຍຄັ້ງກ່ອນເຂົ້າ ຈຳເຈົ້າຈະໄດ້ຖືກອະນຸຍາດໃຫ້ກັບໄປເຮັດວຽກຄືນ.

ຮາຍລະອຽດເພີ່ມເຕີມ - ຜແນກສາທາຣະນະສຸກແຫ່ງຣັດ NSW



1300 066 055

www.health.nsw.gov.au