

แผ่นข้อมูลโรคติดต่อ

โรคไข้เหลือง

โรคไข้เหลืองเป็นโรคติดเชื้อไวรัสที่อาจเป็นอันตรายถึงตายได้ โรคนี้สามารถติดต่อกันได้ทางยุงที่อาศัยอยู่ในบางส่วนของอเมริกาใต้และแอฟริกา จึงจำเป็นต้องมีการฉีดวัคซีนคุ้มกันสำหรับผู้ที่เดินทางไปยังส่วนต่างๆของโลก

โรคไข้เหลือง (Yellow Fever) คืออะไร?

โรคไข้เหลืองคือ โรคติดเชื้อไวรัสที่แพร่เชื้อสู่คนได้โดยยุงที่อาศัยอยู่ในส่วนต่างๆ ของประเทศในทวีปอเมริกาใต้และทวีปแอฟริกา

ลักษณะอาการของโรคไข้เหลืองเป็นอย่างไร?

- อาการของการติดเชื้อ ได้แก่เริ่มมีไข้เฉียบพลัน หนาวสั่น ปวดตามกล้ามเนื้อ ปวดหลัง ปวดศีรษะ คลื่นไส้และอาเจียนสามถึงหกวันหลังจากเชื้อไวรัสเข้าสู่ร่างกาย หลังจากสามถึงสี่วันผู้ป่วยส่วนมากอาการจะดีขึ้นและหายไป
- อย่างไรก็ตาม ประมาณร้อยละ 15 ของผู้ป่วยจะยังคงมีอาการเลือดออก (ทางปาก จมูกและตาและ/หรือท้อง) มีอาการตัวเหลือง (ผิวและตาออกสีเหลือง) เจ็บที่ท้องและอาเจียนและมีปัญหากับการทำงานของไต ครั้งหนึ่งของผู้ป่วยเหล่านี้จะหายเป็นปกติ แต่อีกครึ่งหนึ่งที่เหลือจะตายภายใน 10-14 วันของการเกิดอาการเหล่านี้

โรคไข้เหลืองแพร่เชื้อได้อย่างไร?

- มนุษย์และลิงเป็นสัตว์สองประเภทหลักที่ติดเชื้อไวรัสนี้ได้
- ยุงบางสายพันธุ์ที่ชื่อ ไอคิส ไอจิบที (Aedes aegypti) เป็นตัวแพร่เชื้อไวรัสนี้
- โรคนี้ใช้เวลาสามถึงหกวันที่จะเริ่มมีอาการป่วยหลังจากที่คนผู้นั้นถูกยุงที่ติดเชื้อกัด
- คนที่ติดเชื้อสามารถส่งผ่านเชื้อไปให้ยุงได้เป็นเวลาถึง 5 วันหลังจากเริ่มเกิดอาการ
- โรคนี้ไม่แพร่เชื้อโดยตรงจากคนสู่คนหรือจากสัตว์สู่คน

ใครที่มีความเสี่ยงต่อการเป็นโรคไข้เหลือง?

โรคไข้เหลืองเกิดขึ้นเฉพาะในทวีปแอฟริกาและทวีปอเมริกาใต้ ในประเทศต่างๆที่อยู่ใกล้เส้นศูนย์สูตร นักเดินทางที่ไม่มีภูมิคุ้มกัน และคนที่อาศัยอยู่ในบริเวณเหล่านี้เป็นผู้ที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อ

ป้องกันโรคไข้เหลืองได้อย่างไร?

การฉีดวัคซีนคุ้มกันเป็นวิธีที่ได้ผลที่สุดที่จะป้องกันโรคไข้เหลือง

- การฉีดวัคซีนคุ้มกันต้องจัดการที่ศูนย์ให้วัคซีนคุ้มกันโรคที่ได้รับการรับรอง และจะต้องออกไปรับรองสากลว่าด้วยการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้เหลือง หน่วยงานสาธารณสุขในเขตของท่านสามารถให้รายชื่อศูนย์ฉีดวัคซีนคุ้มกันโรคที่ได้รับการรับรอง (โปรดดูรายละเอียดในการติดต่อข้างล่าง)
- ภายใต้กฎหมายการตรวจกักกันโรคแห่งออสเตรเลีย ค.ศ. 1908 ผู้ใดก็ตามที่อายุเกินหนึ่งขวบ จะต้องมีการรับรองสากลว่าด้วยการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้เหลือง หากพวกเขาพักค้างหนึ่งคืนหรือนานกว่านั้นในประเทศที่ถูกประกาศว่าเป็นประเทศที่มีการติดเชื้อโรคไข้เหลือง ภายในหกวันก่อนที่จะเดินทางมาถึงประเทศออสเตรเลีย รายชื่อประเทศที่ถูกประกาศว่าเป็นประเทศที่มีการติดเชื้อสามารถหาได้ที่: <http://www.health.gov.au/internet/wcms/publishing.nsf/content/health-publth-strateg-communic-factsheets-yellow.htm>
- ประเทศต่างๆ สามารถปฏิเสธไม่ให้ใครเข้าประเทศก็ได้ หากก่อนหน้านี้ไม่นาน เขาเคยไปอยู่ในประเทศที่มีการติดเชื้อโรคไข้เหลือง และเขาไม่มีใบรับรองการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้เหลืองที่ยังใช้งานได้ และบางประเทศเหล่านี้อาจอนุญาตให้ผู้ที่ไม่ได้ฉีดวัคซีนคุ้มกันเข้าประเทศได้ หลังจากได้รับการฉีดวัคซีนที่ชายแดนของประเทศตน การปลอดเชื้อของวัคซีนที่ให้ในสถานการณ์เช่นนี้อาจรับประกันไม่ได้เสมอไป
- คนที่เดินทางมาถึงออสเตรเลียจากประเทศที่มีการติดเชื้อโรคไข้เหลือง โดยไม่มีใบรับรองการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้เหลือง จะถูกเจ้าหน้าที่จากบริการตรวจกักกันโรคแห่งออสเตรเลีย (AQIS) สัมภาษณ์ตอนมาถึง เจ้าหน้าที่อาจอนุญาตให้เฉพาะผู้ที่ไม่ได้ฉีดวัคซีนเข้าประเทศออสเตรเลียได้ หากพวกเขาขอมตกลงเป็นลายลักษณ์อักษร ที่จะแจ้งให้องค์การอนามัยทราบ หากเกิดอาการใดๆ ของการติดเชื้อโรคไข้เหลืองในช่วงหกวัน หลังจากที่พวกเขาออกจากประเทศที่ถูกประกาศว่ามีการติดเชื้อโรคไข้เหลือง

ผู้ที่เดินทางไปประเทศที่มีการติดเชื้อโรคไข้เหลือง ควรใช้มาตรการป้องกันต่างๆ ไม่ให้ถูกยุงกัดด้วยการ

- ใส่เสื้อผ้าแขนยาวหลวมๆ
- ทายากันยุง (ที่ผสมสาร DEET หรือ picardin) เมื่อออกไปข้างนอกบ้าน
- พักในที่ที่ปลอดยุง (เช่น กางมุ้ง)

วินิจฉัยโรคไข้เหลืองได้อย่างไร?

โรคไข้เหลืองในระยะต้นๆ ดูยาก เพราะมีโรคติดเชื้อจำนวนมากที่อาจมีอาการหรือสัญญาณคล้ายคลึงกัน การวินิจฉัยโรคจำเป็นต้องใช้การตรวจเลือด


รักษาโรคไข้เหลืองได้อย่างไร?

- ไม่มีการรักษาเฉพาะสำหรับโรคไข้เหลือง ผู้ป่วยอาจได้รับการรักษาสำหรับภาวะขาดน้ำและอาการไข้ อาจจำเป็นต้องมีการดูแลอย่างเข้มงวดและใกล้ชิดสำหรับผู้ป่วยหนัก
- ในบริเวณที่มียุง *ไอคิปที* (*Aedes aegypti*) อาศัยอยู่ (เช่น รัฐควีนสแลนด์เหนือ) ผู้ป่วยควรได้รับการดูแลในห้องที่ปลอดยุง

การตอบรับของสาธารณสุขเป็นอย่างไร?

โรงพยาบาลและห้องปฏิบัติการจำเป็นต้องแจ้ง ให้นายงานสาธารณสุขในเขตของตนทราบ ในกรณีที่พบผู้เป็นโรคไข้เหลือง เจ้าหน้าที่หน่วยงานสาธารณสุขจะสอบสวนรายชื่อที่อาจจะเป็น เพื่อระบุปัจจัยเสี่ยงสำหรับโรค และป้องกันการติดเชื้อของยุงในพื้นที่อ่อนไหวในออสเตรเลีย

ข้อมูลเพิ่มเติม - หน่วยงานสาธารณสุขในรัฐนิวเซาท์เวลส์



1300 066 055

www.health.nsw.gov.au