

ដង្កូវស៊ីធ្មេញក្នុងចំណោមកូនក្មេង

ដង្កូវស៊ីធ្មេញក្នុងចំណោមកូនក្មេងគឺជាជំងឺធ្មេញដ៏ធ្ងន់ធ្ងរមួយ ដែលអាចកើតមានភ្លាមនៅពេលធ្មេញទីមួយដុះចេញពីអញ្ចាញធ្មេញ។ វាចាប់ផ្តើមជាស្នាម ឬខ្សែត្រង់ស ដែលរីកកាន់តែធំទៅ។ ហើយក្លាយទៅជាពណ៌លឿង ឬពណ៌ត្នោត។ វាអាចទៅជាជំងឺអន្តរាយមួយ ដែលជាញឹកញាប់តម្រូវឱ្យចូលព្យាបាលក្នុងមន្ទីរពេទ្យ និងការព្យាបាលធ្មេញដោយប្រើថ្នាំស្លឹកពេញដងខ្លួនទាំងមូល។

តើអ្វីដែលបណ្តាលឱ្យកើតដង្កូវស៊ីធ្មេញក្នុងចំណោមកូនក្មេង?

- “ការជញ្ជក់សម្រួលអារម្មណ៍ ” លើដបដែលខាងក្នុងមានដាក់វត្ថុជាតិផ្អែម។ ឧទាហរណ៍:
 - ដាក់ទារករបស់អ្នកឱ្យគេងដោយចៅដប ដែលខាងក្នុងមានវត្ថុជាតិផ្អែម ដូចជាទឹកបន្លែផ្លែឈើច្របាច់ ទឹកដោះគោ ឬទឹកដោះម្សៅភេសជ្ជៈមានជាតិផ្អែម ឬភេសជ្ជៈជាតិបន្លែផ្លែឈើខាប់សំរាប់លាយជាមួយទឹក ជាដើម។
 - បណ្តោយឱ្យកូនរបស់អ្នកជញ្ជក់ដបដែលមានវត្ថុជាតិផ្អែមក្នុងអម្បងពេលដេក។
- បរិភោគម្ហូបអាហារដែលមានជាតិស្ករ ហើយស្អិតមានដូចជាស្ករគ្រាប់ នំប៊ីសស្អិត នំផ្អែម ស្លក្រូច នំមានលាយគ្រាប់រុក្ខជាតិជាដើម។ ទាំងនេះគឺជាម្ហូបអាហារ “ម្តងម្កាល” ហើយគួរទុកសំរាប់ឱកាសពិសេសទាំងឡាយ ដូចជាពេលជប់លៀងថ្ងៃខួបកំណើត ជាដើម។ ម្ហូបអាហារណាមួយដែលស្អិតជាប់ធ្មេញ បង្កើនលទ្ធភាពគ្រោះថ្នាក់នៃដង្កូវស៊ីធ្មេញ។
- ពុំបានដុសធ្មេញជារៀងរាល់ថ្ងៃជាមួយថ្នាំដុសធ្មេញមានជាតិហ្វ្លូរាយ នៅពេលគេមានអាយុ១៨ខែ។

តើអ្នកអាចការពារដង្កូវស៊ីធ្មេញបានដោយបែបណា?

- បំបៅទារករបស់អ្នកនឹងដោះ ហើយដាក់កំរិតការបំបៅពេលយប់តាមសេចក្តីត្រូវការរបស់ទារក ក្រោយអាយុ៦ខែ។
- ដាក់ទារករបស់អ្នកឱ្យដេកនៅក្នុងគ្រែ ដោយគ្មានដបបំបៅ។
- ដាក់តែទឹកដោះច្របាច់ ឬទឹកដោះម្សៅទៅក្នុងដបបំបៅប៉ុណ្ណោះ ហើយត្រូវយកដបចេញនៅពេលកូនរបស់អ្នកចៅអស់។
- ចាប់ផ្តើមដុសសំអាតធ្មេញ នៅពេលទារកដុះធ្មេញទីមួយរបស់គេ។
- ជួយកុមារដុះធ្មេញរបស់គេ រហូតទាល់តែគេមានអាយុ៨ឆ្នាំ។
- ណែនាំឱ្យប្រើពែង នៅពេលទារកមានអាយុចាប់ពី៦ខែឡើងទៅ។
- ផ្តាច់ការបំបៅដបកុមារ នៅពេលមានអាយុប្រហែល១២ខែ។
- ផ្តល់ម្ហូបអាហារ និងអាហារស្រស់ស្រូបក្រៅពេលដែលមានសុខភាពល្អ (ម្ហូបអាហារ “ប្រចាំថ្ងៃ”)។
- ដាក់កំរិតចំពោះស្ករគ្រាប់ ម្ហូបអាហារ និងអាហារស្រស់ស្រូបក្រៅពេលដែលមានជាតិស្ករ (ម្ហូបអាហារ “ម្តងម្កាល”) ។
- លើកទឹកចិត្តឱ្យផឹកទឹកនៅចន្លោះពេលបរិភោគអាហារ។ ទឹកក្បាលម៉ាស៊ីនមានសុវត្ថិភាពនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលី វាមានជាតិហ្វ្លូរាយដែលជួយការពារធ្មេញកុំឱ្យដង្កូវស៊ី។
- បើកបបូរមាត់ ដើម្បីឆែកមើលធ្មេញដង្កូវស៊ី។
- នាំកូនរបស់អ្នកទៅឱ្យអ្នកវិជ្ជាជីវៈខាងធ្មេញពិនិត្យមើល ឱ្យបានទាន់ចុងអាយុឆ្នាំទី២របស់គេ។

សន្លឹកព័ត៌មានអំពីធ្មេញ

Khmer / Tooth Decay in Young Children / April 2011

សេវាអ្នកបកប្រែភាសា

ប្រសិនបើអ្នកតម្រូវអ្នកបកប្រែភាសា ដើម្បីទាក់ទងជាមួយសេវាទាំងឡាយខាងលើនេះ ឬសេចក្តីបកប្រែណាមួយ សូមទូរស័ព្ទសេវាបកប្រែអត្ថបទ និងនិយាយ (TIS) តាមទូរស័ព្ទលេខ 13 14 50។

សំរាប់ព័ត៌មានផ្នែកសុខភាពពហុភាសាឡើយ សូមបើកម៉េលរ៉ូបសាយ www.mhcs.health.nsw.gov.au