

Περιφερειακά Εισαγόμενος Κεντρικός Καθετήρας (Peripherally Inserted Central Catheter - PICC)


Peripherally Inserted Central Catheter (PICC)

Πληροφορίες για Ασθενείς

Τι είναι ο Περιφερειακά Εισαγόμενος Κεντρικός Καθετήρας (PICC);

What is a Peripherally Inserted Central Catheter (PICC)?

Οι καθετήρες PICC είναι μικροί, εύκαμπτοι σωλήνες που τοποθετούνται μέσα σε μία φλέβα του άνω βραχίονά σας. Η εσωτερική άκρη του καθετήρα καταλήγει σε μια μεγάλη φλέβα στο θώρακά σας, συννηθέστερα στην άνω κοίλη φλέβα. Σκεφτείτε τον καθετήρα σαν μια πολύ μεγάλη κάνουλα. Οι καθετήρες PICC εισάγονται για να προστατεύσουν τις μικρές σας φλέβες από τα πολλά τρυπήματα που συνδέονται με τις συνεχείς ενδοφλέβιες θεραπείες. Εισάγονται επίσης όταν η θεραπεία σας είναι πολύ συμπυκνωμένη για να χορηγείται μέσα από τις μικρές φλέβες των χεριών.



Περιφερειακά Εισαγόμενος Κεντρικός Καθετήρας

Peripherally Inserted Central Catheter

Οι γραμμές PICC παραμένουν στη θέση τους με ειδικά επιθέματα που συγκρατούν τη γραμμή και δεν της επιτρέπουν να κινείται. Αυτό στη συνέχεια καλύπτεται από άλλο επίδεσμο. Αν είναι δυνατόν, θα πρέπει να αποφεύγεται η παρακολούθηση της πίεσης του αίματος και η δειγματοληψία αίματος από φλέβα κοντά στη γραμμή PICC. Δεν πρέπει να **σηκώνετε βαριά αντικείμενα** καθόλου ενόσω σας έχετε στο βραχίονά σας τον καθετήρα PICC.

Αν ο καθετήρας PICC έχει τοποθετηθεί εκτός του Ακτινολογικού Τμήματος, όπως π.χ. στο θάλαμο, μπορεί να χρειαστεί να κάνετε ακτινογραφία θώρακα για να επιβεβαιωθεί ότι είναι στη σωστή θέση.

Η φροντίδα του καθετήρα σας PICC

Care of your PICC

Κάθε πρόσωπο που αγγίζει τον καθετήρα σας PICC πρέπει να καθαρίζει καλά τα χέρια του και να χρησιμοποιεί γάντια. Αυτό γίνεται για να ελαχιστοποιηθεί η μόλυνση. Οι νοσοκόμες θα εξετάζουν το σημείο εισαγωγής του καθετήρα σας PICC σε κάθε βάρδια. Αν έχετε οποιεσδήποτε απορίες ή ανησυχίες, θα πρέπει να μιλήσετε με τη νοσοκόμα ή το γιατρό σας. Ο καθετήρας PICC και οι σωλήνες δεν πρέπει να αποσυνδέονται πριν από το ντους ή πριν πάτε για περίπατο, καθώς υπάρχει κίνδυνος να φράξουν και να μολυνθούν. Αν δεν είναι σε συνεχή χρήση, «ξεπλένονται» με την έγχυση μιας μικρής ποσότητας υγρού εντός της γραμμής με σύριγγα από τη νοσοκόμα ή το γιατρό. Το σημείο εισαγωγής θα επιδέεται τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα. Ο επίδεσμος μπορεί να χρειαστεί να αλλάξει νωρίτερα αν βραχεί, ξεκολλήσει ή δεν είναι καθαρός.

Περιφερειακά Εισαγόμενος Κεντρικός Καθετήρας (Peripherally Inserted Central Catheter - PICC)

Peripherally Inserted Central Catheter (PICC)

Πιθανά προβλήματα με τη συσκευή PICC

Possible problems with a PICC

Μόλυνση

Είναι δυνατόν να αναπτυχθεί μόλυνση είτε στο εσωτερικό της συσκευής PICC είτε γύρω από το σημείο εισαγωγής. Θα πρέπει να ενημερώσετε το γιατρό ή τη νοσοκόμα σας αν:

- το σημείο εισαγωγής κοκκινίσει ή πρηστεί
- παρατηρήσετε αποχρωματισμένο υγρό να εκκρίνεται από το σημείο εισαγωγής
- παρατηρήσετε οποιοδήποτε πόνο ή αιμορραγία από τη συσκευή PICC
- αισθάνεστε εφιδρώσεις ή ρίγη / πυρετό

Είναι πολύ σημαντικό να μην αγγίζετε άσκοπα τη συσκευή PICC και να έχετε πάντα καθαρά χέρια όταν αγγίζετε τη συσκευή PICC ή τη γύρω περιοχή.

Θρόμβοι

Επειδή η συσκευή PICC τοποθετείται στο κυκλοφορικό σύστημα, είναι δυνατό να σχηματιστεί θρόμβος αίματος (θρόμβωση). Αν συμβεί αυτό, μπορεί να χρειάζεται να αφαιρεθεί η γραμμή. Μερικές φορές χρησιμοποιείται φάρμακο για τη διάλυση των θρόμβων. Θα πρέπει να ενημερώσετε το γιατρό ή τη νοσοκόμα σας αν παρατηρήσετε οποιοδήποτε ασυνήθιστο πρήξιμο στο βραχίονα, το χέρι ή το λαιμό σας.

Θα πέσει ο καθετήρας PICC μου;

Will my PICC fall out?

Επειδή ο καθετήρας PICC είναι πολύ μακρύς (συνήθως 35-55 εκατοστά ανάλογα με το μέγεθός σας) και ασφαρίζεται με ειδικό επίδεσμο, είναι πολύ απίθανο να πέσει. Ωστόσο, θα πρέπει να προσέχετε να μην πιαστεί ή τραβηχτεί κατά λάθος καθώς αυτό θα επηρεάσει τη θέση του. Ποτέ μην μεταχειρίζεστε με δύναμη τον καθετήρα σας PICC.

Πώς αφαιρείται ο καθετήρας PICC;

How is a PICC removed?

Όταν δεν θα χρειάζεστε πια τον καθετήρα PICC, θα αφαιρεθεί. Αυτή είναι μια απλή διαδικασία, που γίνεται από τη νοσοκόμα, παρόμοια με την αφαίρεση μιας κάνουλας, μιας κάνουλας πολύ μεγάλου μήκους. Μια αποστειρωμένη γάζα θα τοποθετηθεί πάνω από το σημείο εισαγωγής. Το σημείο εισαγωγής θα παρακολουθείται και θα επιδένεται ξανά όπως απαιτείται μέχρι να επουλωθεί το δέρμα.

Υπηρεσίες Διερμηνέων

Interpreter Services

Επαγγελματίες διερμηνείς είναι στη διάθεσή σας αν χρειάζεστε βοήθεια για να καταλάβετε ή να μιλήσετε αγγλικά. Οι υπηρεσίες διερμηνέων είναι δωρεάν και εμπιστευτικές. Μπορείτε να ζητήσετε διερμηνέα αν δεν σας προσφερθεί η υπηρεσία. Το προσωπικό θα κλείσει ραντεβού με τον διερμηνέα για σας. Αν χρειάζεστε διερμηνέα για να μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, καλέστε την τηλεφωνική Υπηρεσία Μεταφραστών και Διερμηνέων στον αριθμό 131 450.

Επιπλέον Πληροφορίες

Additional Information

Ημερομηνία Εισαγωγής:

Ενέσιμη Πίεση; Ναι Όχι