



اِندون® ENDONE®

Oxycodone

برای مصرف کننده اطلاعات دارو
این برگه به تعدادی از پرسش های رایج درباره این دارو پاسخ می دهد. برگه شامل تمام اطلاعات موجود در مورد این دارو نیست.

اُکسیکُدون برای چه مصرف می شود؟
اُکسیکُدون به گروهی از داروها که مُسکن های مخدر نامیده می شوند تعلق دارد. مُسکن های مخدر تاثیرشان از بین بردن درد می باشد.

هشدار:
اُکسیکُدون اگر برای مدت طولانی مصرف شود می تواند اعتیاد آور باشد و موجب وابستگی جسمی و روحی شود. اگر در مصرف از آن سوء استفاده شود تاثیر آن در کاهش درد کم می شود.

پیش از مصرف اُکسیکُدون

در صورت داشتن حساسیت به هر یک از موارد زیر از اُکسیکُدون استفاده نکنید:

- هر دارو با محتوای اُکسیکُدون هیدروکلراید
 - هر کدام از مواد ترکیبی داروها که در انتهای این برگه اطلاعاتی نام برده شده اند
 - هر کدام از داروهایی که به نام مُسکن مخدر شناخته می شود مانند، مُرفین، کُدین، تریاک
- بعضی از نشانه های واکنش حساسیت ممکن است جوش پوستی همراه با خارش، تاول پوستی یا بی رنگ شدن پوست در معرض تابش نور خورشید باشد.

در صورت داشتن هر یک مشکلات زیر در گذشته و یا حال از اُکسیکُدون استفاده نکنید:

- آسیب دیدن سر
- تومور مغزی
- اعتیاد به الکل
- صرع (به اصطلاح تشنج یا غش)
- اگر در حال استفاده از داروهای افسردگی موسوم به (ام-آ-او-آی ها) بازدارنده های مونوآمینه اُکسیداس، هستنید و یا در 14 روز گذشته از آن استفاده کرده اید
- مشکلات قلبی از قبیل ضریان قلب نا منظم و/ یا تند
- آسم
- هرگونه مشکل تنفسی
- افسردگی
- سردردهای شدید به علت افزایش فشار در سر

پزشک معالج شما پیش از تجویز اُکسیکُدون برای شما نیاز به دانستن همه این موارد دارد.



چه چیزهایی را باید به پزشک خود اطلاع دهید

به پزشک خود هرگونه حساسیت به هر داروی دیگر، غذا، مواد نگهدارنده و یا مواد رنگی را اطلاع دهید. در صورت داشتن هریک از مشکلات سلامتی / یا شرایط خاص پزشکی زیر، در گذشته و یا حال آن را به پزشک خود اطلاع دهید.

- ضعف عضلانی
- کم کاری غده تیروئید
- بیماری کلیه ای
- بیماری کبدی (جگر)
- فشارخون پایین
- برای مردان، مشکل پروستات یا دشواری در دفع ادرار
- مشکلات روده ای (داخلی)

اگر شما این شرایط را داشته باشید ممکن است استفاده از اُکسیکدون برای شما خطرناک باشد. پزشک شما هنگام توصیه استفاده از اُکسیکدون به شما نیاز به در نظر گرفتن همه این عوامل دارد.

استفاده از داروهای دیگر

شما باید به پزشک خود درباره همه دارو هایی که از آن ها استفاده می کنید اطلاع دهید، این شامل هر گونه داروی خریداری شده از داروخانه، فروشگاه های غذایی بهداشتی و یا سوپرمارکت می شود.

بعضی از داروها ممکن است در تاثیر اُکسیکدون اختلال بوجود آورند این داروها شامل موارد زیر هستند:

- داروهای بیهوشی
- داروهای رقیق کننده خون
- داروهای مداواگر صرع
- داروهای کمکی برای خواب
- داروهای پایین آورنده فشارخون
- داروهای مداوا گر مشکلات روحی، اضطراب و افسردگی
- داروهای مداوا گر علائم " آنفلونزا"
- مُسکن ها
- داروهای آرام کننده دل پیچه و اسپاسم معده

این داروها و مشروبات الکلی ممکن است تحت تاثیر اُکسیکدون قرارگیرند و یا آن ها بر خوب اثربخشیدن اُکسیکدون تاثیر بگذارند. ممکن است نیاز باشد که شما مقدار مصرف این داروها را تغییر دهید و یا ممکن است که نیاز داشته باشید داروی متفاوتی مصرف کنید. پزشک و یا دکتر داروسازتان لیست کامل تری از داروهایی که هنگام مصرف اُکسیکدون باید از آن ها پرهیز کنید دارد.

در زمان بارداری و یا دادن شیرپستان به کودک اُکسیکدون مصرف نکنید چون ممکن است در نفس کشیدن کودک در رحم یا نوزاد مشکل بوجود بیاورد. زنان باردار، آنهایی که قصد بارداری دارند و یا آنهایی که به کودک شیرپستان می دهند باید با پزشکشان در این باره مشورت کنند.

این دارو را به کودکان ندهید. اطلاعات کافی برای توصیه استفاده از این دارو برای کودکان در دسترس نیست.

اگر زمان تاریخ مصرف چاپ شده روی بسته دارو گذشته، یا بسته پاره شده و یا نشانه های دستکاری در بسته است از مصرف اُکسیکدون خودداری کنید.

اگر مطمئن نیستید که آیا باید از اُکسیکدون استفاده کنید، با پزشک خود مشورت کنید.



روش استفاده از اُکسیکُدون

همه دستورهایی را که توسط پزشک یا دکتر داروساز تان به شما داده شده است با دقت دنبال کنید.

چگونه آن را بخورید

اُکسیکُدون را با یک لیوان پر از آب بخورید.
اُکسیکُدون باید بعد از غذا یا با شیر خورده شود.

اگر فراموش کنید که آن را بخورید

اگر خوردن یک نوبت (دُوز) از اُکسیکُدون را فراموش کردید، به محض این که به یادتان آمد آن را مصرف کنید. اگر تقریباً زمان نوبت بعدی مصرف آن است از خوردن نوبت فراموش شده صرف نظر کنید و در زمان مقررنوبت بعدی آن را بخورید.

برای جبران کردن نوبت فراموش شده، مقدار مصرف (دُوز) را دو برابر نکنید.
اگر مطمئن نیستید که چه کار باید بکنید، از پزشک یا دکتر داروساز تان بپرسید.

اگر اضافه مصرف کردید (دُوز اضافی)

بلافاصله برای چاره جویی به پزشک خود یا به مرکز اطلاعات سموم (با شماره تلفن 131126) زنگ بزنید، و یا به بخش اورژانس نزدیک ترین بیمارستان بروید. حتی اگر هیچ نشانه ای از ناراحتی و یا مسمومیت نباشد این کار را بکنید.

در طول زمانی که از اُکسیکُدون استفاده می کنید

کارهایی که شما باید انجام دهید

به همه پزشک ها، دندانپزشک ها و دکترهای داروساز دیگری که معالجه شما هستند بگویید که اُکسیکُدون مصرف می کنید.
درموردی که قرار است خوردن داروی جدیدی را شروع کنید و یا تحت هر نوع عمل جراحی قرار بگیرید این موضوع را به پزشکان معالج بگویید.

در صورت باردار شدن در طول زمانی که اُکسیکُدون مصرف می کنید به پزشک تان اطلاع دهید.

کارهایی که نباید انجام دهید

در طول زمانی که از اُکسیکُدون استفاده می کنید داروی دیگری مصرف نکنید مگر این که با پزشک تان صحبت کرده باشید.
این شامل داروهایی که می توانید بدون نسخه پزشک از داروخانه، سوپرمارکت یا فروشگاه غذای بهداشتی بخرید نیز می شود.

اُکسیکُدون را برای درمان هیچ مورد ناراحتی دیگری به جز آن مورد که پزشک شما دستورش را داده است استفاده نکنید.
استفاده از اُکسیکُدون برای مورد ناراحتی دیگر ممکن است خطرناک باشد.

اُکسیکُدون را به شخص دیگری ندهید، حتی اگر علائم ناراحتی آن ها مشابه به نظر برسد. استفاده از اُکسیکُدون برای شخص دیگر ممکن است خطرناک باشد.

بدون آن که اول با پزشک خود مشورت کنید استفاده از اُکسیکُدون را قطع و یا مقدار مصرف (دُوز) آن را کم یا زیاد نکنید.
اگر مصرف آن را بطور ناگهانی قطع کنید دردتان ممکن است برگردد و ممکن است دچار بعضی از علائم ترک شوید.



چیزهایی که باید مراقب شان باشید

در طول زمانی که اکسیکدون استفاده می کنید هنگام مشروب خوردن مراقب باشید. ترکیب آن ها ممکن است شما را بیشتر از حد معمول دچار سرگیجه، خواب آلودگی و منگی کند.

تا زمانی که متوجه شوید اکسیکدون چه تاثیری روی شما دارد هنگام رانندگی و کار کردن با ماشین آلات مراقب باشید. اکسیکدون ممکن است در بعضی از افراد ایجاد رخوت، خواب آلودگی یا گیجی کند و روی هشپاری اثر بگذارد.

افراد بالای 65 سال از نظر دچار شدن به عوارض جانبی داروها در معرض ریسک بالاتری قرار دارند.

عوارض جانبی

در طول زمانی که اکسیکدون مصرف می کنید اگر احساس ناخوشی کردید در کوتاه ترین زمان ممکن به پزشک و یا داروساز خود اطلاع دهید، حتی اگر فکر نمی کنید که مشکلات ربطی به دارو داشته باشند و یا مشکلات در این برگه اطلاعاتی ذکر نشده باشند.

از پزشک یا داروساز خود بخواهید که به همه پرسش های شما درباره عوارض جانبی پاسخ دهند.

اگر با هریک از موارد زیر روبرو شدید به پزشک یا داروساز خود اطلاع دهید:

- سرگیجه، منگی و سردرگمی، رخوت، افت فشارخون، بیوست، استفراغ، دل بهم خوردگی، مشکل در دفع ادرار، کم شدن دفعات ادرار، خشکی دهان، عرق کردن، قرمز شدن صورت، از دست دادن اشتها، بی حالی یا احساس ضعف، ضربان قلب آهسته، ضربان قلب تند و غیرنرمال، ضربان قلب نا مرتب، افت فشارخون هنگام بلند شدن، کاهش دمای بدن، بی قراری، تغییر روحیه، تنگی مردمک چشم، گرفتگی عضلانی، جوش همراه با خارش یا هرگونه خارش، سردرد شدید به علت افزایش فشار در داخل سر.

از لیست عوارض جانبی بالا نگران نشوید. شما ممکن است که هیچ یک از آن ها را تجربه نکنید یا ممکن است با بعضی از آن ها روبرو شوید. در هر حال، این لیست کامل همه عوارض جانبی ممکن نیست.

اگر هریک از موارد زیر اتفاق افتاد به بخش اورژانس نزدیک ترین بیمارستان خود بروید:

- بیهوشی، عدم توانایی نفس کشیدن بطور مناسب، سرگیجه شدید، خواب آلودگی یا منگ شدن، نشانه های حساسیت (بعنوان مثال جوش پوستی همراه با خارش، تاول های پوستی یا بی رنگ شدن پوست در معرض تابش نور خورشید)

استفاده طولانی مدت ممکن است موجب وابستگی جسمی و مقاومت بدن در برابر دارو شود و اگر اکسیکدون قطع شود ممکن است علائم ترک اعتیاد مشاهده شود.



نگهداری

قرص های اُکسیکدون را تا هنگام مصرف در جعبه اش نگهدارید. قرص ها را در جای خنک، خشک و دور از دسترس کودکان نگهدارید.

از دکتر داروساز خود بپرسید که با داروهای مصرف نشده و یا تاریخ گذشته چه کنید.

مواد ترکیبی

مواد ترکیبی فعال – اُکسیکدون هیدروکلراید

مواد ترکیبی دیگر – لاکتوز آن هیدروس، سلولز-میکروکریستالین، اسید استئاریک.

خدمات ترجمه رایگان و محرمانه، شامل زبان اشاره، 24 ساعته در 7 روز هفته در دسترس میباشد.
از کارمندان بخواهید که برایتان مترجم بگیرند.

مراقبین، مراقبت های مجانی به دیگران ارائه میدهند. آنها ممکنست اعضای خانواده، دوستان یا همسایه ها باشند. در صورت داشتن مراقب لطفاً به کارکنان بگویید.

کشیدن سیگار در تمام مراکز بهداشتی و زمینهای ما 100% ممنوع است. کشیدن سیگار جریمه بدنبال خواهد داشت.
برای ترک سیگار با تلفن 137 849 یا سایت اینترنت www.icanquit.com.au تماس بگیرید

پارکینگ مجانی در محوطه بیمارستان در دسترس میباشد.

ما از نظرات شما درباره این بروشور بعنوان راهی برای بهبود مداوم سرویس خودمان استقبال میکنیم.
نظریات خودتان را به آدرس زیر ایمیل کنید:

WSLHD-Get_Involved@health.nsw.gov.au