



ENDONE®

Oxycodone

정보

이 안내서는 이 약에 관한 일부 공통된 질문들에 대해 답을 드릴 것입니다. 이 안내서에 구할 수 있는 모든 정보가 포함된 것은 아닙니다.

옥시코돈은 어떤 경우 사용되나요?

옥시코돈은 마약성 진통제라고 불리는 그룹에 속합니다. 마약성 진통제는 통증을 경감시키는 작용을 합니다.

경고:

옥시코돈은 장기간 복용할 경우 중독될 수 있으며 정신적 신체적 의존증이 생기게 될 수 있습니다. 이를 남용할 경우, 통증 경감 효과가 줄어들 수 있습니다.

옥시코돈을 복용하시기 전에

다음에 관한 있을 경우 옥시코돈을 복용하지 마십시오.

- 염산 옥시코돈을 함유한 약들 중 어떤 약에라도,
- 이 안내서의 끝부분의 리스트에 언급된 성분들 중 어떤 성분에라도,
- 마약성 진통제로 알려진 유사한 약 (예: 모르핀, 코데인, 아편)중 어느 약에라도 알려지가 있을 경우

알러지 반응의 증상 중 일부는 가려움을 동반한 피부 두드러기, 피부의 물집, 햇빛에 노출된 후 피부변색입니다.

다음 증세를 현재 경험하고 있거나 경험한 적이 있는 분은 옥시코돈을 복용하지 마십시오.

- 머리 부상
- 뇌의 종양
- 알콜 중독
- 간질병 (발작으로도 알려진)
- 모노아민 옥시다제 억제제(MAOIs)라는 항우울제를 복용 중이거나 지난 14 일간 복용하신 적이 있는 경우
- 불규칙한 심박동 또는 빠른 심박동과 같은 심장 문제
- 천식
- 호흡 곤란
- 우울증
- 뇌압 상승으로 인한 심한 두통

귀하의 의사는 귀하에게 옥시코돈을 처방해 드리기 전에 위와 같은 모든 점들을 알아야 할 것입니다.



귀하의 의사에게 꼭 말씀하셔야 하는 사항들

그 외에 다른 약, 음식, 방부제 또는 염색약에 알러지가 있으실 경우 의사에게 말씀하십시오.
다음과 같은 건강상의 문제/의학적 질병을 현재 가지고 계시거나 과거에 경험하셨다면
의사에게 알려주십시오.

- 근육약화
- 갑상선 기능 부전증
- 신장병
- 간과 관련된 질병
- 저혈압
- 남성의 경우 전립선문제 또는 배뇨의 어려움
- 장 질환

이러한 질병이 있으시면 옥시코돈을 복용하시는 것이 안전하지 않을 수 있습니다. 귀하의
의사는 옥시코돈 복용에 관한 조언을 해드릴 때 이 모든 요소들을 고려하여야 할 것입니다.

다른 약 복용

귀하의 의사에게 약국이나 건강식품판매점 또는 슈퍼마켓에서 구입하는 약을 포함한 복용
중이신 모든 약에 대해 알려주십시오.

어떤 약들의 경우 옥시코돈의 효과를 저해할 수 있는데 그러한 약들은 다음과 같습니다.

- 마취제
- 혈액을 희석시키는데 사용되는 약
- 간질병을 치료하는데 사용되는 약
- 수면에 도움을 주기 위해 사용되는 약
- 혈압을 내려주는 약
- 불안과 우울과 같은 정신적 문제를 치료하기 위해 사용되는 약
- “독감” 증세를 치료하기 위해 사용되는 약
- 진통제
- 위경련을 경감시키기 위해 사용되는 약

이러한 약들과 알콜은 옥시코돈의 영향을 받거나 옥시코돈의 작용에 영향을 미칠 수
있습니다. 귀하는 이러한 약들의 복용량을 조절하시거나 다른 약을 복용하셔야 될 수도
있습니다. 귀하의 의사와 약사는 옥시코돈을 복용할 때에 피해야하는 약들을 좀 완벽히
명기한 리스트를 가지고 있습니다.

**임신 중 또는 수유 중에 옥시코돈을 복용하지 마십시오. 복용할 경우 태아 또는 신생아에게
호흡곤란을 일으킬 수 있습니다. 임신중인 또는 임신을 준비하시는 여성 또는 수유중인
여성은 이에 대해 주치의와 상의하셔야 합니다.**

이 약을 어린이에게 주지 마십시오. 어린이의 옥시코돈 복용에 관한 충분한 정보가 없습니다.

옥시코돈의 포장에 인쇄된 유통기한이 지나거나 포장이 찢겨있거나 훼손된 흔적이 보일 경우
복용하지 마십시오.

옥시코돈을 드셔야 할 지 여부에 대해 잘 모르시겠으면 귀하의 의사와 상담하십시오.



옥시코돈의 복용방법

귀하의 의사 또는 약사가 알려드린 모든 안내사항을 주의깊게 따르십시오.

복용방법

한 컵 가득한 물에 옥시코돈을 삼키십시오.
옥시코돈은 식사 후에 또는 우유와 함께 복용하셔야 합니다.

복용하시는 것을 잊으셨을 경우

옥시코돈을 복용하시는 것을 잊으셨을 경우, 기억이 났을 때 최대한 빨리 복용을 하십시오.
그 때가 거의 다음 복용할 시간에 가까운 경우, 잊고 못 드신 복용 분은 건너뛰고 그 다음
복용 분을 드십시오.

잊고 못 드신 복용 분을 보충하기 위해 두 배로 복용하지 마십시오.
어떻게 하실지 모르시면 귀하의 의사 또는 약사에게 문의하십시오.

너무 많이 복용 하셨을 때(과다 복용)

귀하의 의사 또는 독물 정보 센터(전화 13 11 26)로 즉시 전화하셔서 조언을 구하시거나
귀하께 가장 가까운 병원의 응급실로 가십시오. 심지어 불편 또는 중독의 징후가 없는
경우라도 그렇게 하셔야 합니다.

옥시코돈을 복용하시는 동안

반드시 하셔야 할 일들

귀하의 치료를 담당하고 있는 모든 다른 의사, 치과 의사 및 약사에게 옥시코돈을 복용하고
있는 중이라고 말해주십시오. 또한 어떤 약이든 새롭게 복용을 시작하시려고 하거나 어떤
종류의 수술이든 하시게 되면 사전에 그들에게 이점을 알려주십시오.

옥시코돈을 복용하는 중에 임신하시게 되면 귀하의 의사에게 알려주십시오.

하시면 안 되는 일들

귀하의 의사와 상의한 경우가 아니라면 옥시코돈을 복용하시는 동안 그 어떤 다른 약도
복용하지 마십시오. 이것은 약국, 슈퍼마켓 또는 건강식품판매점에서 처방전 없이 구입이
가능한 약들도 포함합니다.

옥시코돈을 귀하의 의사가 지시한 용도 외에 다른 어떤 질병을 치료하기 위해 사용하지
마십시오. 옥시코돈을 또 다른 질환을 위해 복용하는 것은 안전하지 않을 수 있습니다.

옥시코돈을 타인 그 누구에게도 주지 마십시오, 심지어 비슷한 증세를 가진 사람들에게도
주지 마십시오. 다른 사람이 옥시코돈을 복용하는 것이 안전하지 않을 수 있습니다.

귀하의 의사에게 먼저 확인하지 않고 옥시코돈의 복용을 중단하거나 복용량을 낮추거나
높이지 마십시오. 복용을 갑자기 중단할 경우 통증이 다시 돌아오거나 금단증세를 경험하실
수 있습니다.



주의하셔야 할 일들

옥시코돈을 복용하는 동안 술을 드실 때 조심하십시오. 이 둘의 조합은 귀하를 평상시보다 더 어지럽고, 졸리거나 몽롱하게 할 수 있습니다.

옥시코돈이 귀하에게 어떤 영향을 끼치는지를 알기까지는 운전이나 기계작동을 하실 때 주의하십시오.

65 세를 넘으신 분들에게 약의 부작용 위험이 더 높습니다.

부작용들

옥시코돈 복용 중에 아프실 경우 귀하의 의사 또는 약사에게 가능한 빨리 알려주십시오. 심지어 그러한 문제들이 이 약과 관련된 것이 아닌 것처럼 여겨지거나 이 안내서에서 열거한 증상들이 아닐 경우에도 그렇게 하셔야합니다.

부작용에 관한 모든 질문에 대해 귀하의 의사 또는 약사에게 문의하십시오.

다음 중 그 어떤 증상이라도 발견하시면 귀하의 의사 또는 약사에게 알려주십시오.

- 어지러움, 몽롱함, 혼란, 졸림, 저혈압, 변비, 구토, 메스꺼움, 배뇨곤란, 배뇨횟수 감소, 입마름, 땀흘림, 안면홍조, 식욕감퇴, 현기증 또는 힘없음, 느린 심박동, 비정상적이고 빠른 심박동, 불규칙적 심박동, 서있을 때 혈압이 내려감, 체온이 내려감, 불안정, 기분의 변화, 동공수축, 근육경직, 가려운 두드러기 또는 다른 형태의 가려움, 뇌압 상승으로 인한 심한 두통

위에 열거한 부작용 때문에 놀라지 마십시오. 부작용이 생길 수도 전혀 생기지 않을 수도 있습니다. 하지만 이것은 발생 가능한 모든 부작용들이 포함된 리스트는 아닙니다.

다음 중 어떤 증상이라도 발생할 경우 가장 가까운 병원의 응급실로 가십시오.

- 의식을 잃음, 정상적인 호흡불가, 심한 어지러움, 졸림 또는 방향상실, 알러지 증세 (예. 가려움을 동반한 두드러기, 피부물집 또는 햇빛에 노출 후 피부변색)

장기복용의 경우 신체적 의존증과 내성이 생기게 될 수 있으며 옥시코돈을 중단한 후 금단증상이 보일 수도 있습니다.



보관

복용할 시간이 될 때까지 옥시코돈 알약을 용기에 보관하십시오. 이 알약을 서늘하고 건조한 어린이 손이 닿지 않는 곳에 보관 하십시오.

사용되지 않았거나 유통기한이 지난 약은 어떻게 하셔야할지 귀하의 약사에게 문의하십시오.

성분

유효성분-염산 옥시코돈

기타성분- 무수유당, 미결정셀룰로오스, 스테아르산

오슬란 (Auslan)을 포함한 무료 통역사 서비스가 하루 24 시간 주 7 일 제공되며 비밀을 보장합니다. 통역사가 필요하신 경우 직원에게 요청하십시오.

케어러는 다른 사람에게 케어 및 도움을 무급으로 제공하는 사람을 뜻합니다. 케어러는 가족이나, 친구, 이웃도 될 수 있습니다. 본인이 케어러일 경우 직원에게 알려주십시오.

모든 의료시설 및 부지는 100% 흡연금지구역입니다. 위반 시 벌금이 부과됩니다. .
Quitline 전화 137 848 또는

www.icanquit.com.au

병원 내 주차장을 유료 이용하실 수 있습니다.

저희 서비스의 지속적인 향상을 위해 이 브로슈어에 대한 의견을 환영합니다.

의견 보내실 곳:

WSLHD-Get_Involved@health.nsw.gov.au