

ENDONE®

Oxycodone

Tüketiciler için İlâç Bilgileri

Bu broşür bu ilâç hakkındaki bazı yaygın soruları yanıtlamaktadır. Tüm mevcut bilgileri içermemektedir.

Oksikodon ne için kullanılır?

Oksikodon narkotik ağrı kesiciler denilen bir ilâç grubuna dahildir. Narkotik ağrı kesiciler ağrıyı gidermeye yarar.

UYARI:

OKSİKODON uzun süre kullanılırsa zihinsel ve fiziksel bağımlılık yapabilir. Kötüye kullanılırsa ağrıyı kesme özelliği azalabilir.

Oksikodon almadan önce

Aşağıdakilere alerjiniz varsa oksikodon almayın:

- Oksikodon hidroklorid içeren herhangi bir ilâca
- bu broşürün sonunda listesi verilen içeriklerden herhangi birine
- narkotik ağrı kesici diye bilinen morfin, kodein, afyon gibi benzer ilâçlara.

Alerjik tepkilerin bazıları kaşıntılı cilt kızarıklığı, ciltte su toplanması ya da güneş gördüğü zaman cildin renginin değişmesi olabilir.

Sizde aşağıdakilerden herhangi birisi varsa, ya da geçmişte var idiyse oksikodon kullanmayın:

- başta yaralanma
- beyin uru
- alkoliklik
- sara (nöbet geçirme diye de bilinir)
- şu anda ya da son 14 gün içinde Monoamin Oksidaz Engelleyiciler (MAO'iler) adlı depresyon ilâçlarından almışsanız.
- düzensiz ve/veya hızlı kalp atışı gibi kalp sorunlarınız varsa
- astım
- herhangi bir solunum güçlüğü
- depresyon
- kafada basınç artmasının yol açtığı şiddetli baş ağrıları

Doktorunuzun size oksikodon reçetesi yazmadan önce bütün bunları bilmesi gerekecektir.



Doktorunuza söylemek zorunda olduğunuz şeyler

Başka herhangi bir ilaç, besine, koruyucu maddeye ya da boyaya alerjiniz varsa bunu doktorunuza söyleyin.

Aşağıdaki sağlık sorunlarından/rahatsızlıklardan herhangi biri varsa ya da geçmişte olmuşsa bunu doktorunuza söyleyin.

- kaslarda zayıflık
- tiroid bezinin az çalışması
- böbrek hastalığı
- karaciğer hastalığı
- düşük tansiyon
- erkekseniz, prostat sorunları veya işemekte güçlük çekmek
- bağırsak bozuklukları

Sizde rahatsızlıklar varsa OKSİKODON almanız güvenli olmayabilir. Doktorunuzun size OKSİKODON almanızı tavsiye ederken bütün bunları göz önüne alması gerekecektir.

Başka ilaç almak

Eczaneden, sağlıklı besin dükkanlarından veya marketlerden aldıklarınız dahil olmak üzere doktorunuza aldığınız bütün ilaçları söylemelisiniz.

Bazı ilaçlar oksikodona tepkileşebilir ve bunların arasında şunlar vardır:

- anestezi ilaçları
- kanı inceltmek için kullanılan ilaçlar
- sara tedavisinde kullanılan ilaçlar
- uyumaya yardımcı olmak için kullanılan ilaçlar
- tansiyon düşüren ilaçlar
- zihinsel sorunların, evham ve depresyonun tedavisinde kullanılan ilaçlar
- "grip" belirtilerini tedavi için kullanılan ilaçlar
- ağrı kesiciler
- mide kramplarını veya kasılmalarını gidermekte kullanılan ilaçlar

Bu ilaçlar ve alkol oksikodondan etkilenebilir ve oksikodonun ne denli etkili olacağını da etkileyebilir. Bu ilaçların dozunu değiştirmeniz veya başka ilaçlar almanız gerekebilir. Doktorunuzda veya eczacınızda oksikodon alırken kaçınmanız gereken ilaçların daha eksiksiz bir listesi vardır.

Hamileyken veya emzirirken oksikodon almayın, çünkü bu, doğmamış ya da yeni doğmuş çocukta solunum güçlüğüne neden olabilir. Hamile olan, hamile kalmayı düşünen ya da emziren kadınlar bu konuyu doktorlarıyla konuşmalıdırlar.

Bu ilacı çocuklara vermeyin. Çocuklara oksikodon verilmesini tavsiye etmek için yeterli bilgi yoktur.

Paketin üzerindeki son kullanma tarihi geçmişse ya da paket yırtık veya kurcalanmışsa oksikodonu almayın.

Oksikodon alıp alamayacağınızdan emin değilseniz doktorunuza danışın.

Oksikodon nasıl alınır

Doktorunuzun ya da eczacınızın tüm yönergelerini dikkatle izleyin.

Nasıl alınır

Oksikodonu bir bardak dolusu suyla yutun.
Oksikodon yemeklerden sonra veya sütle birlikte alınmalıdır.

Almayı unutursanız

Oksikodonun bir dozunu almayı unutursanız, hatırlar hatırlamaz o dozu hemen alın. Bir sonraki dozu almanıza çok az vakit kalmışsa, kaçırdığınız dozu atlayın ve bir sonraki dozu zamanında alın.

**Kaçırdığınız bir dozu telafi etmek için iki doz birden almayın.
Ne yapacağınızdan emin değilseniz doktorunuza ya da eczacınıza sorun.**

Fazla alırsanız (aşırı doz)

Derhal tavsiye almak üzere doktorunuza veya Zehir Bilgilendirme Merkezine (telefon 13 11 26) telefon edin ya da en yakın hastanenin Acil Bölümüne gidin. Bir rahatsızlık veya zehirlenme belirtisi yoksa bile bunu yapın.

Oksikodon kullandığınız süre içinde

Mutlaka yapmanız gerekenler

Sizi tedavi eden tüm doktorlara, dişçilere ve eczacılara oksikodon aldığınızı söyleyin. Ayrıca yeni bir ilaç almaya başlayacaksanız veya ameliyat olacaksanız da onlara söyleyin.

Oksikodon aldığınız süre içinde hamile kalırsanız bunu doktorunuza söyleyin.

Kesinlikle yapmamanız gerekenler

Oksikodon aldığınız süre içinde doktorunuzla konuşmadan başka hiçbir ilaç almayın. Buna eczaneden reçetesiz alabileceğiniz veya marketlerden veya sağlıklı besin dükkanlarından alacaklarınız da dahildir.

Oksikodonu doktorunuzun belirttiğinin dışında başka herhangi bir şikâyet için almayın. Oksikodonu başka bir şikâyet için almak güvenli olmayabilir.

Belirtileri sizinkine benziyor olsa bile, oksikodonu bir başka kişiye vermeyin. Bir başka kişinin oksikodon alması güvenli olmayabilir.

Önceden doktorunuza danışmadan oksikodon almayı kesmeyin ya da dozunu azaltıp artırmayın. Birden keserseniz, ağrılarınız yeniden başlayabilir ve bazı çekilme belirtileri olabilir.

Dikkat edilecek şeyler

Oksikodon aldığınız süre içinde alkol alırsanız dikkatli olun. İkisi birleşince başınız dönabilir, uykunuz gelebilir ya da kendinizi her zamankinden halsiz hissedebilirsiniz.

Oksikodonun sizi nasıl etkilediğini bilinceye kadar araç sürerken veya makine kullanırken dikkatli olun. Oksikodon bazı kişilerde mahmurluk, uyuklama veya baş dönmesine neden olabilir ve uyanıklılığı etkileyebilir.

65 yaşının üstündeki kişilerde ilâçların yan etkilerinin olma riski daha fazladır.

Yan Etkileri

Oksikodon alırken kendinizi iyi hissetmezseniz ve sorunun ilâçla bir bağlantısı olmadığını düşünseniz ya da bu broşürde belirtilmemişse bile en kısa zamanda bunu doktorunuza veya eczacınıza söyleyin.

Doktorunuzdan veya eczacınızdan ilâcın yan etkileri hakkında olası tüm sorularınızı yanıtlamalarını isteyin.

Aşağıdakilerden herhangi birisi varsa bunu doktorunuza veya eczacınıza söyleyin:

- baş dönmesi, içinizin geçmesi ve kafa karışıklığı, mahmurluk, düşük tansiyon, kabızlık, kusma, bulantı, işemekte güçlük çekmek, eskisinden dah az sıklıkta işemek, ağız kuruluğu, terleme, yüz kızarması, iştah kaybı, kendinizi zayıf hissetmek, kalp atışının yavaşlaması, anormal veya hızlı kalp atışı, düzensiz kalp atışı, ayağa kalkınca tansiyonun düşmesi, vücut ısısının düşmesi, huzursuzluk, ruh halinde değişiklikler, göz bebeklerinin küçülmesi, kaslarda sertleşme, kaşıntılı kızarıklıklar veya başka tür kaşıntılar, kafanın içindeki basıncın artmasının yol açtığı şiddetli baş ağrısı.

Yukarıda sıralanan yan etkilerden paniğe kapılmayın. Bunlar sizde olabilir de, olmayabilir de. Ancak bu, tüm olası yan etkilerin tam listesi değildir.

Aşağıdakilerden herhangi birisi olursa, size en yakın hastanenin Âcil Servisine gidin.

- Bilinç kaybı, iyi soluk alamamak, şiddetli baş dönmesi, mahmurluk veya yön duygusunun yitilmesi, alerji belirtileri (kaşıntılı cilt kızarıklıkları, cildin su toplaması ya da güneş gördüğü zaman cildin renginin değişmesi gibi)

Uzun süre kullanılırsa fiziksel bağımlılık olabilir, etkisi azalabilir ve OKSİKODON bırakıldıktan sonra çekilme belirtileri gözlemlenebilir.



Depolama

**Alma zamanı gelinceye dek oksikodon tabletlerini kendi kaplarının içinde tutun.
Tabletleri serin ve kuru bir yerde ve çocuklardan uzak tutun.**

Kullanılmayan ya da kullanma süresi geçmiş ilâçları ne yapacağınızı eczacınıza sorun.

İçindekiler

Etken maddeler – Oksikodon hidroklorid

Diğer maddeler – Suyu alınmış laktoz, mikrokristalli sellüloz, stearik asit.

Auslan dâhil, ücretsiz ve saklılık içinde çalışan bir tercümanlık servisi
haftanın 7 günü, günün 24 saati mevcuttur.

Görevlilerden sizin için bir tercüman ayarlamalarını isteyin.

Bakıcılar başkaları için bakım ve ücretsiz yardım sağlarlar. Bunlar aile fertleri, arkadaşlar veya komşular olabilir.
Bakıcınız varsa lütfen bunu görevlilere söyleyin.

Sağlık tesislerimiz ve açık alanlarında sigara içilmesi %100 yasaktır. Cezası vardır.
Sigara bırakma hattını (Quitline) arayın: 137 848 veya

www.icanquit.com.au

Hastane yerleşkesinde ücretli park yerleri vardır.

Hizmetlerimizi sürekli olarak geliştirmenin bir yöntemi olarak bu broşür hakkında geri bildirimlerinizi hoşnutlukla
karşılıyoruz.

Geri bildirimlerinizi şuraya gönderebilirsiniz:
WSLHD-Get_Involved@health.nsw.gov.au