



ENDONE®

Oxycodone

消费者药物资讯

本单张为关于本药的一些常见疑问提供了答案，但并不包含所有已知信息。

羟考酮是用来做什么的？

羟考酮属于一组称为麻醉镇痛药的药物，麻醉镇痛药的作用就是缓解痛楚。

警告：

若长期使用，羟考酮可能会让人上瘾，导致精神和身体产生依赖性。滥用羟考酮可能会减低该药物缓解痛楚的效力。

服用羟考酮前注意事项

如对以下物质过敏，不要服用羟考酮：

- 任何含有盐酸羟考酮的药物。
- 本单张末段所列任何成份。
- 任何其他名为麻醉镇痛药的类似药物，例如吗啡、可待因、鸦片。

过敏反应的例子包括发痒的皮疹、皮肤出现水泡、皮肤在阳光曝晒后褪色。

若现时或曾经出现任何以下情况，不要服用羟考酮：

- 头部受伤
- 脑肿瘤
- 酗酒
- 癫痫
- 现时或过去 14 天曾服用名为单胺氧化酶抑制剂 (简称 MAOIs) 的抗抑郁药物
- 诸如心跳不规则及/或过速等心脏问题
- 哮喘
- 呼吸困难
- 抑郁
- 因头部压力上升引致严重头痛

你的医生在给你羟考酮处方前需要知道以上所有情况。



有~~些~~是什么是你必须告诉你的医生的

如果你对任何药物、食物、防腐剂或染料过敏，告诉你的医生。

如果你现时或过去有任何以下健康问题，告诉你的医生：

- 肌肉无力
- 甲状腺不够活跃
- 肾脏疾病
- 肝脏疾病
- 低血压
- 男性前列腺问题或小便困难
- 肠道疾病

如果你有上述问题，服用羟考酮可能不安全。你的医生建议服用羟考酮时需要考虑所有这些因素。

服用其他药物

如有服用任何药物，均必须告诉医生，包括从药房、健康食品店、超市购买的药物。

有些药物可能会干扰羟考酮，包括：

- 麻醉药
- 稀释血液的药物
- 治疗癫痫的药物
- 帮助睡眠的药物
- 降低血压的药物
- 治疗精神疾病、焦虑症、抑郁症的药物
- 治疗“感冒”症状的药物
- 止痛药
- 舒缓胃绞痛或胃痉挛的药物

这些药物和酒精可能会受羟考酮影响或影响羟考酮的效力，你可能需要改变这些药物的用量或改用其他药物。你的医生或药剂师会有一份较完整的列表，列明在服用羟考酮期间需避免的药物。

怀孕或哺乳期间不要服用羟考酮，否则可能会导致胎儿或初生婴儿呼吸困难。 孕妇，计划怀孕或正在哺乳的女性需与医生商讨这个问题。

不要给小孩子服用本药。 目前还没有足够的信息支持儿童服用羟考酮的建议。

若羟考酮包装上的到期日显示已经逾期，不要服用。若包装破损或显示曾遭破坏，也不要服用。

若不肯定是否应该服用羟考酮，咨询你的医生。



怎样服用羟考酮

小心遵从你的医生或药剂师给你的所有指示。

怎样服用

用一杯清水吞服羟考酮。
羟考酮应在餐后服用或以牛奶送服。

如果忘记服用

如果忘记服用羟考酮，一旦记起来立刻服用；如果已经差不多是下一次服药的时间，漏掉的一次不用补服，只需按下一次服药的时间服药。

漏掉的一次不要以服用双倍药量来补偿。

如果你不知道该怎么办，问问你的医生或药剂师。

如果你过量服用

立即打电话给你的医生或毒药信息中心 (**Poisons Information Centre**, 电话 **13 11 26**)，或前往就近医院的急诊室。就算没有任何不适或中毒迹象，仍需照办。

服用羟考酮期间

必须做的事

告诉其他给你治疗的医生、牙医、药剂师你正在服用羟考酮。准备服用新药或进行任何手术前也应通知他们。

服用羟考酮期间如果怀孕，告诉你的医生。

不可以做的事

除非已经和你的医生商议，否则在服用羟考酮期间不要服用任何其他药物，包括可从药房、超市或健康食品店购买的非处方药物。

不要用羟考酮来治疗任何你的医生没有指明的状况。使用羟考酮治疗其他状况可能会不安全。

不要把羟考酮给其他人服用，就算症状看来相近。其他人服用羟考酮可能会不安全。

未经医生指示，不要擅自停药羟考酮或增减药量。如果你突然停药羟考酮，你的痛楚可能会再次出现，你也可能会出现断瘾症状。



需小心注意事项

服用羟考酮期间饮酒需倍加小心。酒精加上羟考酮会使你比平常更觉昏眩、困倦或头晕。

明确了解羟考酮对你的影响之前，开车或操作机器时需倍加小心。一些人服用羟考酮可能会引起嗜睡、困倦或昏眩，影响警觉性。

65 岁以上人士出现药物副作用的风险会较高。

副作用

服用羟考酮期间如感到不适，尽快告诉你的医生或药剂师，就算你不认为不适是与羟考酮相关，或者不适的症状没有在本单张列出。

如有任何关于副作用的问题，向你的医生或药剂师提出，寻求答案。

如出现任何以下情况，告诉你的医生或药剂师：

- 昏眩、头晕、神智混乱、嗜睡、低血压、便秘、呕吐、恶心、小便困难、小便次数减少、口干、流汗、脸红、食欲不振、晕眩或感觉虚弱、心跳缓慢、心跳不正常和快速、心跳不规则、站立时血压下降、体温下降、烦躁、情绪变动、瞳孔收缩、肌肉僵硬、皮疹发痒或其他形式的发痒、因头部压力上升引致严重头痛。

不要让上文列出的副作用把你吓怕，你不一定会出现这些副作用的。不过，可能出现的副作用也不止于此。

如果出现任何以下情况，立刻前往就近医院的急诊室：

- 意识不清、不能正常呼吸、严重昏眩、嗜睡或神志不清、出现过敏症状 (例如发痒的皮疹、皮肤出现水泡、皮肤在阳光曝晒后褪色)

长期使用羟考酮可能会导致身体产生依赖性和耐受性，停用后可能会出现断瘾症状。



储存

羟考酮药片应存放在容器内，服用时才取出。应存放在阴凉干燥以及儿童不能触及的地方。
向你的药剂师询问如何处理未用完或过期的药物。

成份

活性成份 – 盐酸羟考酮。

其他成份 – 无水乳糖、纤维素微晶、硬脂酸。

设有免费和保密的医疗卫生传译服务，包括澳洲手语 (Auslan) 传译，每周 7 天，每天 24 小时。请向职员要求为你安排传译员。

照顾人就是为他人提供护理和无偿帮助的人士，他们可能是家人、朋友或邻居。如果你有照顾人，请通知医疗人员。

所有我们的医疗卫生设施都是 100% 禁烟的，违者罚款。如需联络 Quitline: 137 848 或

www.icanquit.com.au

医院范围内提供收费停车位。

我们欢迎你对本小册子提出反馈，以不断改善我们的服务。
反馈意见请送往：

WSLHD-Get_Involved@health.nsw.gov.au